

黑河榉树 榉树 佳邦

产品名称	黑河榉树 榉树 佳邦
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

榉树播种育苗种子采集母树选择根据选用目的分别选择结实多、籽粒饱满的健壮母树采种。榉树（1）培育用材林，母树要求树形紧凑、树体高大、干形通直、枝下高较高、旺盛且无病虫害。（2）培育园林绿化品种，母树要求树冠开阔、树体丰满、叶色季相变化丰富、色叶期较长；变色期早。（3）盆栽观赏类型，榉树价格，母树要求树体矮小，树形奇异。采种时间与采种方法10月下旬至11月上旬，当果实由青转褐色时采种。采用自然脱落法或敲打小枝法在地面收集种子。采种后要先除去枝叶等杂物，然后摊在室内通风干燥处自然干燥2~3d，再行风选。贮存前于室内自然干燥5~8d，使种子含水量降到13%以下。

榉树是园林绿化中常见的苗木，种榉谐音“中举”，寓意吉祥，因此广受欢迎。但近年来该树病虫害危害较严重，黑河榉树，接下来小编就为大家介绍一下常见的病虫害及其防治方法。

榉秋四脉绵蚜

秋四脉绵蚜，瘿绵蚜科四脉绵蚜属的一种昆虫。具有转移寄主特征，是榉树重要的害虫。该虫以卵在树木枝干、树皮缝中越冬。翌年4月下旬越冬卵孵化为干母若蚜，爬至新萌发的树叶背面固定为害，5月上旬在受害叶面形成紫红色或黄绿色无刺毛的袋状虫瘿，干母独自潜伏在其中为害，5月中旬干母老熟，在虫瘿中胎生仔蚜，即干雌蚜的若蚜，每只干母能繁殖8—15头或更多，丛生榉树，5月下旬至6月上旬，有翅干雌蚜长成，又称春季迁移蚜，迁往高粱、玉米根部胎生繁殖为害，9月下旬又产生有翅性母，飞回树枝干上产生性蚜，榉树，交配后产卵越冬，每雌产1粒卵，产在体下。

防治方法：

(1)根型蚜为害严重时，用40%乳油1kg加氯化铵化肥25~30kg，对水500kg，浇淋榉树根部，干旱时要注意防止药害。

(2)有条件地区也可用50%辛硫磷乳油1500倍液灌根。

木虱

木虱跟蚜虫很相似，常被误认为蚜虫，该虫不仅危害榉树，也是无患子的重要害虫。该虫一般4月底开始出现，能耐高温，7月至8月危害严重，直到10月中旬才基本结束。被害叶片除了叶片扭曲、畸形、生长停止，同时也是煤污病的制造者和病毒的传播媒介。

防治方法

(1)休眠期防治。用3-5°Be石硫合剂喷榉树干、枝，消灭越冬害虫。

(2)活动期防治。根据危害情况，每年可对榉树防治2-3次，防治时间为6、7、8月的上旬。

榉树属在亚洲有6种，我国产4种。

(1)大叶榉(*Z. schneideriana* Hand-Mazz.), 叶片较大，表面粗糙，叶缘具锐尖锯齿，背面密生柔毛，生小枝密布柔毛，适宜于用材和观赏等。

(2)光叶榉[*Z. serrate* (Thunb.) Makino]，叶背面光滑，叶缘具钝尖锯齿，小枝，适宜于用材和观赏等。

(3)小叶榉(*Z. sinica* Schneider)，叶片特小，坚果大，又叫大果榉，适宜于观赏和用材等。

(4)台湾榉(*Z. formosana* Hayata)，适于用材和观赏等。

黑河榉树-榉树-佳邦(诚信商家)由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园是一家从事“榉树,乌桕,丛生朴树,丛生女贞,池杉,落羽杉,高杆红叶石楠”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“榉树,乌桕,丛生朴树,丛生女贞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使佳邦在花木中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！