

红花紫薇移植 佳邦 白城红花紫薇

产品名称	红花紫薇移植 佳邦 白城红花紫薇
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

红花紫薇树花期是每年的5到8月份，结果的时间是每年的9月份左右。花朵边缘有不规格的缺刻纹路，都是生长在当年生的嫩枝上面，红花紫薇，基部呈长爪，花蕊的外侧有6枚花丝，子房有6个，结的果实呈圆形，表面光滑，长9到13毫米，宽7到10毫米，颜色为褐红色。

秋冬季节的红花紫薇树的枝干整体是光秃秃的，像一颗死掉的枯树，这个时候的红花紫薇树处于冬眠状态，将枝干退一层皮后里面的还是青色的。大多农户都是在这个季节选在修剪紫薇树，上面每年叶子修剪很方便造型。

春季过后温度升高后红花紫薇树干枯的枝干上长出很多嫩叶，新生长出来的叶子边缘颜色偏褐红色，很好看。经光照后树叶子颜色又变成绿色，红花紫薇树喜阳光，光照充足温度高的夏季紫薇树才能生长的更快，白城红花紫薇，在这个季节多施肥，让它尽情的生长可不做修剪。叶子生长茂盛的时候轻轻的牵扯它的枝条，整颗紫薇树都会颤动，人们也常喜欢叫他懒洋洋树。

红花紫薇在每一年的6月份盛开，整株开花期将近4个月。

夏季和秋季，红花紫薇已经盛开，它的漂亮品牌形象在阳台、校园内、马路边和生态公园经常可以看到。红花紫薇花开花期长，因而被称作“百日红”，并被称作“夏日绿，放眼望去是红花”，大红花紫薇价格，是观赏植物、观查茎和观查根的好盆栽原材料。根、皮、叶和番禺能够作为药品。

红花紫薇，是紫薇花属绿色植物，花型有蓝紫色、粉红色、鲜红色等，穗状花瓣由几十朵花朵构成，在开花期时花瓣摆满树枝，盛开非常壮阔，由于养起来较为非常容易，因此许多街头园林绿化常常看到，并且它也是有十分非常好的喻意，代表好运气，因此也被许多爱花之人养在家里。

红花紫薇种植管理方法粗放型，但要立即剪去干枝、害虫枝，并损坏。以便增加开花期，应适度剪去已开过花的枝干，使之再次萌芽期，长出下一轮枝丫。

以便树杆粗枝，能够很多剪去枝丫，集中化营养成分塑造树杆。实践经验：管理方法适度，红花紫薇一

年中乾数次剪修可让其盛开数次，长达100~120天。

提升阳光照射：红花紫薇喜太阳，生长发育时节务必置户外太阳处。

适度浇灌：春冬两个季节应维持盆景土潮湿，夏秋季时节每日早中晚要浇灌一次，旱灾高温时每日可适度提升浇灌频次，以河流、河水、降水及其存储2天至三天的饮用水浇施。11、

按时上肥：盆栽植物红花紫薇上肥过多，非常容易造成枝干陡长，若缺肥反倒造成枝干沉细，茶叶的颜色变黄，全部主茎生长发育势减弱，盛开少或不盛开。因而，要按时上肥，春夏季生长发育热季需多上肥，转秋后少施，冬天进到休眠状态并不施。

下雨天和高温天气的下午不必上肥，上肥浓度值以“薄肥勤施”的标准，在春分至寒露每过10天施一次，红花紫薇移植，立立秋后每半个月左右追肥一次，霜降后停肥。

害虫预防以及预防霜霉病、

表现症状：霜霉病关键伤害叶子，而且叶子比黄叶非常容易被浸染；此病也伤害枝干、嫩梢、花蕾及花骨朵。病发前期，叶子上出现乳白色小粉斑，扩张后正圆形或不规律形退色软斑，花受浸染后，表层被覆白霜层，花穗畸型，丧失观赏性。

受霜霉病损害的主茎会越来越偏矮，叶子歪曲、畸型、凋谢，叶子不进行、缩小，枝干畸型等，比较严重时全部主茎都是身亡。

红花紫薇移植-佳邦-白城红花紫薇由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园实力不俗，信誉可靠，在江苏镇江的花木等行业积累了大批忠诚的客户。佳邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！