

果树栽培季技术培训 西山园林 金庭盛海林果园艺场

产品名称	果树栽培季技术培训 西山园林 金庭盛海林果园艺场
公司名称	吴中区金庭盛海林果园艺场
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区金庭镇堂里村涵头上2组13号
联系电话	18550519634 18550519634

产品详情

枇杷种植条件

光照

枇杷原产于针阔叶混交林的荫蔽森林环境，故幼苗仍保留着喜欢散射光的习性，育苗时应搭棚遮荫。但成年树要求足够光照，西山园林，以利花芽分化、果实发育、着色和提早成熟。其层生性强的特性也说明要充足的光照。但树干受烈日直射易造成灼伤，使枝叶枯萎。

水分

枇杷喜空气湿润、水分充沛的环境，园林树木栽植培训，要求年降雨量在1000毫米以上，且分布较均匀。早春果实发育期和新梢生长期，要求水分较充足，春旱对生长及结果不利。但果实成熟期多雨则易发生裂果，着色差，味淡，成熟迟。夏末初秋则要求较少雨量和干燥气候，使生长减缓，利于花芽分化。

黄毛虫的危害：黄毛虫是枇杷主要的害虫，果树栽培季技术培训，以幼虫为害嫩叶、嫩芽，发生多时也能食害老叶、嫩茎、表皮及花果。叶片受害后成缺刻。严重时整株叶片被食光，仅留叶脉。幼虫淡黄色至橙黄色，各节背线和两侧气门都有毛瘤，上生刺毛。其中第六节背面有一对明显的黑褐色毛瘤，有毒。一年发生3代以上，代发生在5 - 6月，第2代在7 - 8月，第3代在9 - 10月。以蛹在树枝、树皮隙缝或叶

片背面结茧越冬。

防治方法：除捕杀幼虫，冬季修剪、摘虫茧，保护利用天敌和寄生蜂之外，必须在春、夏、秋梢期，掌握幼虫初孵化时喷洒药剂。可采用20%杀灭菊酯乳油3000 - 4000倍液、2.5% C₂₂H₁₉Br₂NO₃4000 - 5000倍液、90%敌百虫晶体1000 - 1500倍液或50%杀螟松乳油800倍液，杀灭幼虫。

排水与灌水 枇杷不耐水渍，雨季积水易造成烂根，影响生长甚至死树。因而在排水不畅的平地或粘土上建园，应每2 - 4行开一条40 - 50cm深的排水沟，以利雨季排水。尤其在7 - 8月花芽生理分化期更应该注意排水工作，保持适当干旱，有利于花芽分化。在果实成熟期间若降雨过多，易造成果实着色不良或裂果，此期应注意排水。3 - 4月春旱期间正值幼果发育时期，园林养护管理，应适当灌水，9 - 10月的夏秋干旱，对花穗的生长发育有严重影响，如天气干燥也应灌水抗旱。

果树栽培季技术培训-西山园林-金庭盛海林果园艺场由吴中区金庭盛海林果园艺场提供。吴中区金庭盛海林果园艺场是从事“果树苗木销售,小区别墅绿化养护,果品采摘,农副产品销售等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。