

延吉灭杀除抓老鼠蟑螂华清公司

产品名称	延吉灭杀除抓老鼠蟑螂华清公司
公司名称	延边州华清环境科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	01:蟑螂光 02:老鼠光
公司地址	延吉爱丹路318号308室（延边医院公交站点南3F）
联系电话	13843388178 13843388178

产品详情

延边州华清环境科技有限公司,卫生有害生物防治协会会员。成立2016年地址爱丹路318号经州工商局注册的法人单位。是一家从事有害生物防治（PCO）、消杀防疫、消毒灭菌、害虫控制、老鼠、蟑螂、蚊蝇防制等工程服务的公司。成立来注册资金200万，拥有的虫害防制和技术队伍。具有下发中级技术职称人员。针对蚊、蝇、老鼠、蟑螂、的防制工作中有丰富的经验和成熟的技术。

现在为大家科普下蟑螂的小常识希望你有所帮助

苏南京和南通等地，也曾在室内捕获的蟑螂体内分离出多种真菌，包括大量的黄霉菌病菌。形态特征-雄成虫翅展26.2~27.2mm.触角羽状：前翅灰褐，内横

线和中横线显著黑.翅面有一近梯形的暗褐区域.外缘线有黑点1列：后翅淡灰褐。

雌成虫翅展23~24mm.触角丝状。卵馒头形.直径.3~0.5mm

,有纵条纹.初为淡绿.孵化前灰褐。幼虫初孵时体灰褐.取食后绿；老龄圆筒形.头部椭圆形.沿蜕裂线有黑"八"字纹.背中线肉粉.亚背线内侧有不规则

三角形黑斑13对。蛹体长12.1~13.5mm,初为绿后渐变红褐，臀棘2根.平行。生物学-北京一年发生3~4代，以老熟幼虫在草坪中越冬。幼虫6龄.3月中旬

越冬幼虫取食.5月下旬见1代幼虫.7月下旬至8月上旬为2~3代幼虫为害期。虫咬食根茎或将叶片吃成缺刻.严重时地上部分成片枯黄。成虫趋

光.产卵于叶片近部，卵块长条形.外覆黄绒毛。1.7mm,卵圆形，灰绿至绿褐，头背黑.体背淡，胸.腹背有斑纹。

体表粗糙.有粒状刻点组成的网纹.毛短.额瘤圆；触角短，为体长2/5;胫节粗链：腹管圆筒形.长于尾片.有缘突及切迹；尾片三角形，顶，曲

毛6~8根。有翅孤雌胎生 体长约1.7mm,长卵形,头、胸部黑,腹部绿,有斑纹;翅脉粗黑:触角为体长的2[^]3:腹管圆筒形,灰至灰黑。生物学

-北京一年发生1余代,以卵在桃树芽腋、缝隙等处越冬。桃树芽苞膨大期卵孵化为干母,干母为害芽苞,幼叶展开时在叶背为害,使叶向反面纵卷、肿胀扭曲为绿变红伪虫瘿。7月产生有翅,向其他桃树扩散蔓延,夏季高温时发生受抑,秋末产生雌、雄,交配并产卵越冬。形态特征-成虫体黑褐,被黑浓毛:雄姓前翅1/3处,后翅基部1/2处布有黑鳞毛.前

、后翅近端半部透明。雌姓翅退化.胸足3对.胸两侧各有淡黄刚毛3丛.腹宽大。

卵椭圆形.黄至深。幼虫雌体乳白.背浅淡.每节背有棕斑2对:头部有褐斑.胸部各节背板有褐纵带5条.腹足退化:雄体小.深。蛹体褐。护囊长锥形,褐.构

紧密.瘦长.内壁灰白光滑.外用丝缀连枝梗

碎叶。本区介于温带和北亚热带。东部沿海地区,东南暖湿气流有一定影响,冬春

有来自西伯利

亚的冷空气;冀北、晋中南部半湿润地区,春季风力强烈,春旱较严重,降水年变率大;西部半干旱地区,春季雨少,冬季降水量仅占全年降水总量的2—

4,故常出现旱灾。