

湖南饲料级双乙酸钠检测 饲料添加剂碘酸钙测试

产品名称	湖南饲料级双乙酸钠检测 饲料添加剂碘酸钙测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

饲料添加剂成分的检测，常见如氨基酸、维生素、微量元素等的检测，绝大多数都有国标和行标，按其检测即可。

饲料添加剂成分的定性检测，如显色反应、紫外、熔点、薄层鉴别等。

饲料添加剂成分的定量方法，如：普通灵敏度（滴定法）、高灵敏度（GC、HPLC、MS）等。

当饲料添加剂产品的化学结构特殊或由多组分混合组成时，如含有螯合物和络合物、寡糖、多糖、复合酶、手性化合物及复合微生态制剂等，常规的方法通常不能得到满意的检测结果，应具体问题具体对待，选择合适的检测方法。

通过观察和测定产品/掺杂物的表观特征（如：颜色、气味、光泽、显微特征等）、理化特点（如：显色、熔点、密度等），色谱和质谱差异（如：HPLC、GC、HPAEC、GC/MS、MS/MS、LC/MS(MSMS)、NMR图谱等）等进行确认。

如果您想深入了解饲料添加剂领域的相关问题或者有其他工业生产技术上面的难题，工艺、配方改进上面的问题，欢迎咨询第三方检测机构，程诚检测可根据客户具体需求来定制研发适合的产品，欢迎有需求客户咨询，试样。

饲料添加剂使用的配伍禁忌

在畜禽饲料中，加入一些饲料添加剂，可起到促进生长，提高肉、奶、蛋产量，降低饲料消耗和防病治病等作用。但是，有些饲料添加剂不能同时使用。

1、胆碱不能和某些维生素、钙、磷同时使用。

胆碱易溶于水，碱性很强，对于水溶性维生素，如维生素C、维生素B、维生素K1、维生素K2和泛酸等能起破坏作用。此外，磷和钙在酸性环境中易被吸收，而在碱性环境中则吸收很少。所以，胆碱也不能与钙粉、磷酸氢钙等一起添加。

2、维生素B1不能与青霉素同时使用。

因维生素B1的水溶液呈弱酸性，会破坏青霉素的功效。

3、亚铁、氯化亚铁、硫化亚铁不能与维生素A、维生素D、维生素E和维生素B1、B2同时使用。

若同时使用，前者会加速后者的氧化破坏过程。