

# 非洲猪瘟发病前期症状,治疗非洲猪瘟有效产品

产品名称	非洲猪瘟发病前期症状,治疗非洲猪瘟有效产品
公司名称	山东合正生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	祥泰广场1号楼25楼
联系电话	13011710575 15336345243

## 产品详情

非洲猪瘟开始是在 1921 年非洲肯尼亚被发现，30年后传入欧洲，50年传入加勒比海地区和南美洲。今年，我国在8月份出现非洲猪瘟后，已经发生多起疫情。高传染性，高死亡率，所以，我们的养殖户要注意加强防范。

二、非洲猪瘟的传染特性非洲猪瘟高传染性，那么都是如何传染？通过什么途径传染呢？

1. 非洲猪瘟传染源非洲猪瘟病毒是唯一的虫媒 DNA 病毒，软蜱是主要的传播媒介和贮存宿主。软蜱吸了感染病毒的猪的血液，再去叮咬健康猪，那么健康猪就被感染了。非洲猪瘟的潜伏期是4-19天，也有的会长达4个周。猪是非洲猪瘟病毒唯一的自然宿主，除家猪和野猪外，其它动物不感染该病毒。3种非洲野猪疣猪、大林猪、非洲野猪感染后不表现症状，但是也携带病毒，是病毒的储存器。猪发病后就携带大量病毒，身体的各个组织器官、分泌物、排泄物、体液等均有高浓度病毒，比如唾液，鼻涕，眼泪、尿液、粪便等都是含有病毒的。说白了，只要染病了，即使没有表现出来症状，整个猪的所有东西都是含有病毒的，其他健康猪接触之后就会被病毒感染，经过潜伏期之后就会发病。另外，猪肉及猪肉制品，被污染的饲料、水源、器具、泔水、工作人员及其服装以及污染空气均能成为传染源，经口和上呼吸道途径传播。非洲猪瘟的传播途径非常广泛。直接的就是接触感染的猪。还有接触到感染的饲料、粪便、猪的体液等都会被感染。根据俄罗斯相关部门的调查显示动物及动物产品的移动或接触、饲喂泔水是主要的传播方式。所以说，如果猪圈里面有一个猪感染，那基本上全部都会被感染。

三、诊断与防治方法非洲猪瘟跟猪瘟的症状很像，所以临床诊断比较困难，不能确定。进一步确定需要采集样本到实验室确定。发现以下临床症状即为疑似病例，应该立即向兽医站报告，由兽医站进行采集样品确定。

1. 临床表现非洲猪瘟感染后有啥表现呢？由于感染病毒的毒力不同，非洲猪瘟有四种：最急性、急性、亚急性、慢性型。猪感染最急性非洲猪瘟之后直接倒地死亡，无任何症状，死亡率100%，很迅速，毫无应对之力。部分猪死亡之前会发烧，全身充血。急性潜伏期4-6天，亚急性6-12天，症状基本相似。急性和亚急性都有发烧症状，感染后发烧到40度以上，皮肤发红，出红斑。喜欢挤在一起，喜欢喝脏水，有粘性分泌物，走路摇晃，呼吸困难。由急性和亚急性之后变为慢性。发烧温度在39-40.5摄氏度，吃食少、瘦弱，便秘腹泻交替出现。病情拖延有时候可以达到一个月后死亡。

2. 防治方法目前，非洲猪瘟并无疫苗进行预防和治疗，而且发病快、感染迅速，所以要引起各地养殖户和有关部门重视，立即采取措施。防治方法：消灭传染源和切断传播途径是主要方法。有关专家提出方法为“灭、查、限、禁”。灭，就是消灭感染的生猪，封锁、扑杀、消毒、无害化处理等工作，力争在更短时间内彻底拔除疫点。查，全面检查生猪屠宰场和猪肉交易市场，加强排查检测。限，就是限制移动。生猪感染后一旦移动就会将传染源带到别的地区，所以，必须限制生猪移动，严格检查生猪调运。禁，禁止泔水饲喂生猪。建议不要用未经过高温处理的厨房剩余物饲喂生猪。

很多养猪人大半辈子都是在跟猪“打交道”，也经历过很多大风大浪，这次非瘟来袭，同样是一次艰难的考验，但眼前只有两个选择：要么一蹶不振，要么绝地反击，希望各位养殖户能够做后者，抗非到底。zui后为大家推荐一款防控非瘟的产品，效果十分好！值得使用！