

# 襄阳市饲料游离棉酚含量检测

产品名称	襄阳市饲料游离棉酚含量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料。

检测范围：鱼粉、仔猪、生长肥育猪配合饲料、鸡配合饲料、饲料用大豆粕、饲料添加剂大豆磷脂、蛋鸡复合预混合饲料、奶牛复合微量元素维生素预混合饲料。

### 饲料相关标准及法律法规

#### 1、GB 13078-2001《饲料卫生标准》

该标准规定了饲料、饲料添加剂产品中有害物质及微生物的允许量及其试验方法。

#### 2、GB 10648-1999《饲料标签》

该标准规定了饲料标签设计制作的基本原则、要求以及标签标示的基本内容和方法。

#### 3、GB/T 18823-2002《饲料检测结果判定的允许误差》

该标准规定了在饲料质量监测时对检测结果判定的允许误差值。

### 料处理技术

#### 一、酸化处理

为了弥补断乳仔猪胃酸不足造成的消化不良，应对饲料进行酸化处理。可在饮水或饲料中添加1%-3%柠

柠檬酸或乳酸，使饲料的PH值降到5左右，也可以在饲料中加入0.3%的胃蛋白酶制剂，这样既可促进消化，又能抑制肠道病原微生物的繁殖。

## 二、发酵处理

取小苏打、甜酒曲、海蛎粉、辣蓼各50克，六一散3袋，茶叶5克，贯众，山药、茯苓、陈皮各250克，葡萄糖500克，分别研磨混匀，再加入5个鸡蛋清、6公斤细米糠拌匀，加水调和至手握紧能成团，松手即散(含水量65%左右)时，装入容器压紧发酵，温度必须控制在35 -45 之间，冬天温度低需要盖塑料(10825,5.00,0.05%)薄膜和其他保温物。3天后，料呈黄色并且有浓烈甜苹果芳香气味时，即为自制“药曲种”，敞开放在阴凉处晾干备用。喂时，按粗饲料粉40%、麦麸10%、骨粉2%、鱼粉2%、玉米(2342,1.00,0.04%)45%、复合饲料添加剂(微量元素)一袋的比例，每50公斤饲料中拌入自配“药曲种”150克，另加清水50公斤调和，温度、湿度与“药曲种”相同，然后把饲料装入容器内经24小时发酵，待产生浓烈甜酒苹果香味时，就可取用饲喂，每日按4次喂给，每次喂2公斤-3公斤，并在每次吃完后搭喂些青绿多汁饲料。

## 三、糖化处理

玉米、大麦、高粱等精料，都含有丰富的淀粉，如果进行糖化处理，可使其中一部分淀粉转化为麦芽糖，不仅可以改善饲料适口性，而且也更容易消化。先把粉碎后的精料放入容器内，然后倒入2倍-2.5倍80 -90 的热水充分搅拌成糊状，为了不使饲料温度迅速下降，可在饲料表面撒上一层厚约5厘米的干料，盖上木盖或塑料薄膜，使温度保持在55 -60 左右，约需3-4小时即可使饲料糖化，糖化好的饲料，贮存时间最好不要超过14小时，以随制随喂为宜，以免酸败变质。