

茉莉香葡萄无核剂处理方法,茉莉香葡萄膨大剂厂家

产品名称	茉莉香葡萄无核剂处理方法,茉莉香葡萄膨大剂厂家
公司名称	公主岭市范家屯镇杨坤果树苗木培育基地
价格	40.00/瓶
规格参数	含量:100ml 适用品种:茉莉香葡萄, 着色香葡萄 适用品种:吉林四平
公司地址	吉林省四平市公主岭市范家屯镇
联系电话	13125832904 13039027770

产品详情

茉莉香葡萄无核剂处理方法,茉莉香葡萄膨大剂厂家、大量批发出售茉莉香葡萄苗,茉莉香葡萄膨大剂,茉莉香葡萄无核剂,着色香葡萄沾花药,郁金香葡萄拉花药,京玉玫瑰葡萄蘸花药水,吉林大药,茉莉香膨果药,产品特点,长果粒,尖果粒,增加产量,平均串重500g以上,提早成熟,果肉硬,闭花产品,经过15年使用,效果稳定,不裂果,不掉粒。

吉林大药茉莉香无核剂膨大剂使用中注意沾药时机,一号药兑水5公斤,开花前5-7天用,果粒展开百分之90,果粒即将开花时用,温度在25度左右,避开阴雨天和高温,二号药和一号药间隔两周,果粒达绿豆粒和黄豆粒大小之间,注意病害发生,追施钙镁硼锌等微量元素肥。

大药使用方法:选择是晴天,多云天气也可以,配药使用水温20度左右,刚从井里抽出来的水就可以,水温高了影响效果,一号药10斤水兑一桖药,棚温达到16度以上开始沾药,用矿泉水桖剪去一半,装满药水把果穗完全侵入药液中,停顿1-2秒,果穗不齐一定要分批沾,在药液中加入食用红色素辨别,正常开花前5-10天沾药,花序穗轴伸开,花瓣即将开放,或有几个花瓣已开为好。

二号药兑水20斤,花后5-10天,花瓣大部分脱落,颗粒绿豆大小为好,方法同上,

在沾膨大前全株喷施防灰霉病,葡萄黑果柄掉粒。

吉林杨坤苗圃有着色香葡萄专用沾药药出售,大量着色香葡萄苗出售

使用注意:使用本品不得随便改变加水量,不得添加其它药,浸沾均匀,不要再用其它膨大剂处理果穗,否则影响效果,保护地因温度不均,应分批处理。

温度管理:沾药当天尽量管理低一些适合药液慢慢吸收,如果温度高易出现裂粒现象(冷棚发生较多,暖棚少见),管理20~23,开花前25~27,见开花至坐果期管理23~25,坐果后再管理25~27,冷棚坐果期间25~27,主要是吐果期间,由于果粒刚吐出来时,一定要看好温度,尤其是中午不能

高，看温度好看到下午一点多，温度不能再升高才可以放松，中午时适当降低温度管理，比如暖棚吐果期管理23~25，建议中午10时30分~14时管理23~24，10时30分前和14时后可以管理24~26，有人会不理解，为什么这样管理，是因为光照越强时湿度就会降低，湿度低温度高会影响坐果，种植蔬菜也是如此，很多棚友种菜产量低，品质差都是这个原因没有掌握好造成的，看到的朋友以后种菜高产时不要忘记我哟。其它各个时期也要注重中午不要高温管理，。

沾药时期掌握的挺好，白天温度管理的也挺到位，水分浇的也行，果也坐住了，有的朋友发现果粒密，有的朋友说拉散了，拉散了就容易没果肩，卖相不好，究竟是什么原因呢，告诉大家是自己家棚的保温程度不一样，还有就是升温早和晚有关系，比如说棚的保温性能好，夜温就会高，拉的就散，升温早的在元旦前沾药的棚夜温低可能就不散，升温晚的在2月份沾药的，棚温高了，可能就会拉的散，总结一下，在沾药时期要考虑自己的棚保温程度，如果棚温夜间高，要考虑适当晚沾1~2天，如果夜温低就适当早沾1~2天，在沾完药管理过程中，发现果穗拉的散就适当晚关风，晚放棉被，如果没拉开，就适当早点关风和早点放棉被，在实际生产中，认可果粒密一些也不要散，大家只能在生产过程中灵活掌握，我只是告诉大家这些原因，祝大家都能掌握好，造出穗型美观的好葡萄。

茉莉香葡萄无核剂处理方法,茉莉香葡萄膨大剂厂家、大量批发出售茉莉香葡萄苗，茉莉香葡萄膨大剂，茉莉香葡萄无核剂，着色香葡萄沾花药，郁金香葡萄拉花药，京玉玫瑰葡萄蘸花药水，吉林大药，茉莉香膨果药，产品特点，长果粒，尖果粒，增加产量，平均串重500g以上，提早成熟，果肉硬，闭花产品，经过15年使用，效果稳定，不裂果，不掉粒