

茉莉香葡萄苗闭花授粉药、长果尖粒茉莉香膨大剂无核剂效果

产品名称	茉莉香葡萄苗闭花授粉药、长果尖粒茉莉香膨大剂无核剂效果
公司名称	公主岭市范家屯镇杨坤果树苗木培育基地
价格	40.00/瓶
规格参数	含量:100ml 适用品种:茉莉香葡萄, 着色香葡萄 产地:吉林长春
公司地址	吉林省四平市公主岭市范家屯镇
联系电话	13125832904 13039027770

产品详情

茉莉香葡萄苗闭花授粉药、长果尖粒茉莉香膨大剂无核剂效果, 厂家:吉林杨坤苗圃, 规格:100ml水剂、50ml、水剂, 适用品种, 着色香葡萄, 郁金香葡萄, 巨茉莉葡萄, 茉莉香葡萄

一、沾药及坐果期间管理：

此期间管理非常重要，是全程管理的重要时期，种植户当引起重视，管理好了，成功率就高，忽视管理不易成功，失败的可能性会很大，很多种植户刚种葡萄不懂管理，师父也是多，谁的话都听，后把自己搞糊涂了，不知道怎么做好了，造成的后果不堪设想，我告诉你怎么管理正确，看看你能不能信我的。沾药前暖棚没铺地膜和滴灌的要铺好地膜和滴灌管，冷棚可以不铺地膜，铺地膜有讲究，开花坐果的作物在开花坐果期都是需要适合的空气湿度，土壤湿度，和适合的温度坐果才会理想，地膜铺得过于严实，空气湿度会低、即使用了我这坐果率高的药也会影响坐果，距离主干一面留10厘米左右的缝，适当向棚内空间释放湿度（进入膨大期再适当扒宽，膨大期更需要空气湿度），这样做才算合理，沾药时期见图片说明，沾药当天好选择晴天，多云天气也可以，配药用的水用温度计量到20 左右，称重10斤水兑一瓶药，棚温度达到16 以上时开始沾药，冷棚露水下去时开始沾药，沾药时用矿泉水瓶剪去一半，装满药水将果穗完全侵入药液中，停顿约1~2秒即可，沾药时果穗的松散度也就是沾药适期，不可能一致，选择适合沾药的果穗，为防止下次沾药时分不清沾完药的果穗，在药液中加入适量食用红色素会更好辨别，果穗不齐，一定要分批沾药，沾早了会出现果穗拉的过长，果粒下垂，没有果肩，影响商品价值，也会出现果粒没有型成就沾药引起的不坐果现象。正常花前3~5天沾药，由于沾药后闭花直接吐粒，7~8天吐粒属于正常现象，吐粒晚说明沾早了，大家要掌握沾药时期非常重要

二、茉莉香无核剂膨大剂使用方法：

选择是晴天，多云天气也可以，配药使用水温20度左右，刚从井里抽出来的水就可以，水温高了影响效果，一号药10斤水兑一艳药，棚温达到16度以上开始沾药，用矿泉水瓶剪去一半，装满药水把果穗完全侵入药液中，停顿1-2秒，果穗不齐一定要分批沾，在药液中加入食用红色素辨别，正常开花前5-10天沾药，花序穗轴伸开，花瓣即将开放，或有几个花瓣已开为好。

二号药兑水20斤，花后5-10天，花瓣大部分脱落，颗粒绿豆大小为好，方法同上，

在沾膨大前全株喷施防灰霉病，葡萄黑果柄掉粒。

吉林杨坤苗圃有着色香葡萄专用沾药药出售，大量着色香葡萄苗出售

使用注意：使用本品不得随便改变加水量，不得添加其它药，浸沾均匀，不要再用其它膨大剂处理果穗，否则影响效果，保护地因温度不均，应分批处理。

三、茉莉香葡萄苗简介：

茉莉香葡萄苗果穗紧密，单颗粒重4~6克，成熟度一致，大小整齐，一般穗重280~350克，大穗重可达600克，果穗圆筒状，带副穗，果皮较厚，柔韧，果皮与果肉易分离，果汁多，无肉囊，属于极耐贮品种，成熟的果实具有浓郁的茉莉香味。该品种果实含糖量较高，含糖量可达20%以上，9月初成熟之时可溶性固形物含量达到19%~22%，品质好，口感佳。

我公司主要经营茉莉香葡萄膨大剂，茉莉香葡萄无核剂，茉莉香葡萄苗，着色香葡萄苗，吉胜李子苗，鸡心果苗，龙丰果树苗