盆景出租 盆景租赁 其他

产品名称	盆景出租 盆景租赁 其他
公司名称	杭州奥杰森园艺有限公司
价格	.00/盆
规格参数	类型:其他 尺寸:20—60（cm） 产地:中国
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州秋涛路 杭州临平 杭州萧山 杭州滨江 杭州下沙
联系电话	0571 86713176 13735871318 13735871318

产品详情

类型	其他	尺寸	20—60（cm）
产地	中国	品牌	杭州奥杰森园艺有限公司

澳洲杉 别名：异叶南洋杉、异叶南洋杉、诺福克南洋杉、细叶南洋杉。 学名：araucaria heterophylla
科属：南洋杉科、南洋杉属
产地与分布：大洋洲诺福克岛以及澳大利亚东北部各岛，我国福建、广东等省有栽培。 形态特征：常绿乔木，一般盆栽为幼树，高在2米以下。树冠尖塔形，深绿色，树冠表皮常横裂或呈条片状脱落；新表皮具古铜色光泽。茎干直立，侧枝轮生，水平伸展。小枝二列互生，水平延伸或略下垂。叶有二型：幼树或侧枝上的叶为钻形，向上弯曲，长约12厘米，排列疏松，光绿色；大树或老枝上的叶卵形或三角状卵形，长约６厘米，排列紧密。球果近圆形。 生长习性：喜温暖、潮湿的环境，在阳光充足的地方生长良好，有一定的耐阴力，但要避免夏季强光曝晒。不耐寒冷和干旱，适合于排水良好富含腐殖质的微酸性砂质壤土。 栽培管理：盆栽时，以园土、腐叶土、泥炭苔混合配制而成的基质为好。盆栽多用小苗，并应根据苗的大小选择相宜的花盆。诺福克南洋杉喜欢漫射光，宜置于棚内明亮处。若长期放于阴暗处，应隔几周移到阳光下适当照射，可使浓绿的叶子保持美丽的色泽。生长季节长，除夏季温度超过32°C时，整年都能生长。 在春到秋季间，应多浇水，但忌盆内积水。高温干燥时，要对盆株及附近的地面喷水，以降温增湿。浇水要及时，不要待土壤干燥后再浇水。自秋末以后，逐渐减少浇水，以增强其抗寒力。生长季节应每隔２周追施一次肥料，以含氮、钾的复合肥为宜。供肥不足，易使枝叶泛黄。 生长过程中，为避免主干向一面倾斜，宜半月转盆一次，让植株均匀受光。此外，幼树树干脆弱，容易弯曲变形，宜从幼株时就立以支柱以固定主干。为防止植株长得过高，应每隔２－３年在春暖后换盆一次。平时要注意保护好侧枝，以免被损害而影响株形。在正常情况下，不必修剪枝条，让其自然生长。生长适温为10～25°C，越冬温度为５°C以上。越冬季节，可给予一定的光照，盆土也不可过干，晴朗天气还应喷水增加湿度。 繁殖方法：主要靠种子繁殖，但扦插也能繁殖子株。 １、播种培育出的苗坚挺强壮，生长旺盛，适宜作批量繁殖。一般在7～8月间，将刚刚采到的种子先破伤种皮，以促进发芽，否则留土久易使种子腐烂，然后再将处理过的种子播于沙床中，覆盖细砂约1.5～2厘米。保持25～28°C和一定湿度的条

件下，约经2～3周即可发芽，发芽后立即进行栽植。 ２、扦插时，若选择主轴或徒长枝作插穗，易造成植株冠形不正，只能横向生长，影响观赏价值。切取容易生根的健壮枝条先端2～3节为插穗，除去部分叶子，用清水浸泡一夜，然后插入以粗砂或蛭石为基质的沙床中。保持20～25℃的温度和较高的空气湿度，３个月左右后即可生根.病虫害防治：其病虫害极少，在室内养护时，多见介壳虫危害，可喷施杀扑磷、毒死蜱·机乳油、国光蚧必死等防治，效果良好。

澳洲杉

别名：异叶南洋杉、异叶南洋杉、诺福克南洋杉、细叶南洋杉。

学名：araucaria heterophylla

科属：南洋杉科、南洋杉属

产地与分布：大洋洲诺福克岛以及澳大利亚东北部各岛，我国福建、广东等省有栽培。

形态特征：常绿乔木，一般盆栽为幼树，高在2米以下。树冠尖塔形，深绿色，树冠表皮常横裂或呈条片状脱落；新表皮具古铜色光泽。茎干直立，侧枝轮生，水平伸展。小枝二列互生，水平延伸或略下垂。叶有二型：幼树或侧枝上的叶为钻形，向上弯曲，长约12厘米，排列疏松，光绿色；大树或老枝上的叶卵形或三角状卵形，长约６厘米，排列紧密。球果近圆形。

生长习性：喜温暖、潮湿的环境，在阳光充足的地方生长良好，有一定的耐阴力，但要避免夏季强光曝晒。不耐寒冷和干旱，适合于排水良好富含腐殖质的微酸性砂质壤土。

栽培管理：盆栽时，以园土、腐叶土、泥炭苔混合配制而成的基质为好。盆栽多用小苗，并应根据苗的大小选择相宜的花盆。诺福克南洋杉喜欢漫射光，宜置于棚内明亮处。若长期放于阴暗处，应隔几周移到阳光下适当照射，可使浓绿的叶子保持美丽的色泽。生长季节长，除夏季温度超过32℃时，整年都能生长。 在春到秋季间，应多浇水，但忌盆内积水。高温干燥时，要对盆株及附近的地面喷水，以降温增湿。浇水要及时，不要待土壤干燥后再浇水。自秋末以后，逐渐减少浇水，以增强其抗寒力。生长季节应每隔２周追施一次肥料，以含氮、钾的复合肥为宜。供肥不足，易使枝叶泛黄。 生长过程中，为避免主干向一面倾斜，宜半月转盆一次，让植株均匀受光。此外，幼树树干脆弱，容易弯曲变形，宜从幼株时就立以支柱以固定主干。为防止植株长得过高，应每隔２－３年在春暖后换盆一次。平时要注意保护好侧枝，以免被损害而影响株形。在正常情况下，不必修剪枝条，让其自然生长。生长适温为10～25℃，越冬温度为５℃以上。越冬季节，可给予一定的光照，盆土也不可过干，晴朗天气还应喷水增加湿度。

繁殖方法：主要靠种子繁殖，但扦插也能繁殖子株。

１、播种培育出的苗坚挺强壮，生长旺盛，适宜作批量繁殖。一般在7～8月间，将刚刚采到的种子先破伤种皮，以促进发芽，否则留土久易使种子腐烂，然后再将处理过的种子播于沙床中，覆盖细砂约1.5～2厘米。保持25～28℃和一定湿度的条件下，约经2～3周即可发芽，发芽后立即进行栽植。

２、扦插时，若选择主轴或徒长枝作插穗，易造成植株冠形不正，只能横向生长，影响观赏价值。切取容易生根的健壮枝条先端2～3节为插穗，除去部分叶子，用清水浸泡一夜，然后插入以粗砂或蛭石为基质的沙床中。保持20～25℃的温度和较高的空气湿度，３个月左右后即可生根.

病虫害防治：其病虫害极少，在室内养护时，多见介壳虫危害，可喷施杀扑磷、毒死蜱·机乳油、国光蚧必死等防治，效果良好。