

??

??

???

新型前臂吊带简介：

前臂吊带又称手臂吊带，上肢吊带，肩颈腕托带，港式吊带，三角吊带，适用于胳膊摔伤，手胳膊肘骨折固定，上肢微创手术手指需要向上固定的。临床上上肢骨折(如肩关节脱位、肘关节脱位、锁骨骨折、肱骨外髁颈骨折、肱骨干骨折、前臂双骨折等)、手外伤、臂丛神经损伤、肩部或上臂外伤、肩部手术后、脑卒中偏瘫上肢其它疾病手术后的病人需行前臂悬吊。

前臂吊带手臂吊带厂家-肩颈腕托带-肘关节固定带

新型前臂吊带使用方法：

手臂骨折吊带的绑法，一般对于手臂骨折以后的病人，可以用的前臂吊带进行悬吊，使肘关节屈曲90度，然后中列位放于胸前，进行悬吊，包扎，另外，对于骨折的地方需要用夹板或者是石膏托或者支具外固定，才更有利于病人骨折愈合的。再就是对于这样的病人，早期肯定会出现手肿胀的情况，需要进行手指的屈伸活动，来促进静脉回流利于消肿饮食方面需要禁忌辛辣刺激食物，需要戒烟戒酒，因为这些会影响病人骨折愈合。

另外，正常的情况下，一般保护到一个半月左右拍片复查，如果发现有骨痂生长了，就可以去掉外固定，烫洗加强关节的屈伸活动，来恢复正常关节活动度。

一般对于小孩手臂骨折以后，睡觉必须要注意保护才可以。因为小孩不像大人一样意识比较好，可能会由于不自主的剧烈运动，而引起骨折的错位或者是影响骨折愈合。一般建议严格的进行石膏脱或者加满外固定，用绷带或者三角巾悬吊患肢于胸前睡觉就可以，这样既可以稳妥的固定，有利于静脉的回流利于消肿，更有利于后期骨折的愈合。这就是小孩手臂骨折进行睡觉的姿势。对于小孩手臂骨折以后的病人，一般愈合快。正常的情况下大约三到四周左右应该就有明显的骨痂生长，那时候就可以进行拍片检查。如果有骨痂生长就可以去掉外固定，然后烫洗，加强关节的屈伸活动来恢复正常功能就可以了。

前臂吊带手臂吊带厂家-肩颈腕托带-肘关节固定带