

找西克化工 湖南有机硅渗透扩展剂订购

产品名称	找西克化工 湖南有机硅渗透扩展剂订购
公司名称	广州西克化工技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区绿地中央广场E座1901
联系电话	13922164616 13922164616

产品详情

有机硅渗透扩展剂订购——广州西克化工技术有限公司专注农药助剂生产制造厂家欢迎大家前来咨询！

气温慢慢回暖，病虫害也多起来了，化学防治是的一种手段。有些农药虽然效果很好，但却不能在敏感作物上喷施。下面列举一些常见农药，对这些农药敏感的作物附在后面，大家不妨收藏起来，没事多看看，好能记住，以免使用不当，除草剂有机硅渗透扩展剂订购，影响收成。

杀菌剂

【石硫合剂】桃、李、梅、梨、葡萄、豆类、马铃薯、番茄、葱、姜、甜瓜、黄瓜等。

【波尔多液】马铃薯、番茄、辣椒、瓜类、桃、李、梨、苹果、柿子、白菜、大豆、小麦、莴苣等。

【代森锰锌】、葫芦科、某些梨。梨小果时施用代森锰锌易出现果面斑点。浓度高会引起稻叶边缘枯斑。

【托布津】防治猕猴桃的病虫害时，应避免使用托布津。可与多种农药，包括碱性药剂混用，但不宜与铜制剂混用。

【多菌灵】可与一般杀菌剂混用，但要随配随用。不能与铜制剂混用。

【百菌清】对梨、柿易发生药害，不宜使用。苹果落花后20天内也不能使用。高浓度对梨树、柿、桃、梅易产生药害。

【多硫胶悬剂】高浓度的多硫胶悬剂等在高温期施用会引起柑桔日灼。

【硫磺】黄瓜、大豆、马铃薯、李、梨。

【氟硅唑】某些梨品种幼果期(5月份以前)很敏感，忌用。

【氧化亚铜】果树期和幼果期。

【烯啶醇】西瓜、大豆、辣椒(高浓度时药害)。

有机硅渗透扩展剂订购——选广州西克化工技术有限公司-增效快-可提高-节约成本

蓟马主要发生在春夏秋三季，蓟马的个体较小，大多在1.5~2毫米左右，蓟马具有锉吸式口器，植物的汁液，蓟马的成虫善于跳跃，躲避性很强，一般很难防治，蓟马虽然在三个季节都有发生，但天气如果出现干旱，发生的严重，蓟马适宜在空气相对湿度。在50~60%左右，适宜的温度一般22~28度左右。在白天阳光照射下，蓟马会隐蔽起来很难见到，在清晨与傍晚，夜间，或阴天出来危害。蓟马的成虫和若虫，都会对西瓜，茄子，黄瓜等植物造成危害，特别在植物的顶端幼嫩之处，纤维少，汁液多，蓟马喜欢聚集在这些地方进行危害，受到蓟马危害的部位生长缓慢，幼果受害后，湖南有机硅渗透扩展剂订购，常造成落花落果出现，给种植的蔬菜等农作物的品质与产量造成很大的影响。蓟马繁殖快，叶面肥有机硅渗透扩展剂订购，同时又具有和蚜虫一样能传播病毒的弊端，杀虫剂有机硅渗透扩展剂订购，植物出现病毒病之后，经过蓟马挫伤植物表皮吸取汁液之后，然后转株危害健康植株，就会将病毒完成传播。在防治上我们需要多方面进行防治，农业物理防治与化学防治相结合，预防为主，可取得较好的效果。

有机硅渗透扩展剂订购——广州西克化工技术有限公司专注农药助剂生产制造厂家欢迎大家前来咨询！

杀虫、杀螨剂

【乙酰】不宜在桑、茶树上使用。

【磷】甘蔗。（注意：多地已经明令禁止在蔬菜上使用）

【蜚】。（注意：多地已经明令禁止在蔬菜上使用）

【杀螟丹(巴丹)】水稻扬花期、白菜、甘蓝等十字花科蔬菜幼苗。

【杀虫双】白菜、甘蓝等十字花科蔬菜幼苗，棉花叶面喷雾。豆类、柑桔类果树对其敏感，只能用低浓度。

【杀虫单】棉花、、四季豆、马铃薯及某些豆类。

【威(巴沙)】瓜、豆、茄科作物。

【异丙威】薯类作物。

【甲萘威(西威因)】瓜类。

【抑太保】白菜幼苗。

【】只能作根际埋施用，不能溶水喷洒。

【噻酮】白菜、萝卜。

【吡虫啉】豆类、瓜类。

【石油乳剂】对某些桃树品种易产生药害，好在落叶季节使用。

【合剂】在夏季使用合剂对柿子有明显药害，春夏时节对柑桔产生不利影响。

【松碱合剂】落叶果树对其都很敏感，在夏季生长季节不宜使用。

【克螨特】梨树禁用。

【锡】25%锡可湿性粉剂除对春梢嫩叶期(低温)有药害，会造成严重落花、落叶、落果，在幼果期(气温在20 以下)仍会造成叶、果畸形。使用浓度以1500-2000倍液为宜。对脐橙药害需进一步试验。

【三磷锡】20%三磷锡乳油500、2000倍液对柑桔春梢嫩叶均有药害。

【三氯杀螨醇】柑桔(忌氯作用)上使用后易导致药害，轻者叶片灰白，重者老叶落光(三氯杀螨砵同)。山楂及苹果的某些品种易产生药害，不宜使用。

【及氧】猕猴桃、人参果对、氧化特别敏感，禁用。

找西克化工-湖南有机硅渗透扩展剂订购由广州西克化工技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州西克化工技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为表面活性剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!