

# 20%甲基立枯磷乳油

产品名称	20%甲基立枯磷乳油
公司名称	宁夏三丰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	平罗县红崖子乡宁夏精细化工基地黄河东路以南、精细化工路以西3-3#地块
联系电话	13815609756 13815609756

## 产品详情

20%甲基立枯磷乳油是一种广谱、高效、低毒的有机磷新型杀菌剂，对稻、麦、棉、蔬菜瓜果等农作物的各种病害具有良好的防治效果。是一种替代常规杀菌剂的防治土传病害的优良药剂。

甲基立枯磷是一种广谱、高效、低毒的新型有机磷杀菌剂，其吸附作用强，不易流失，在土壤中有一定持效期；但这种吸附性为非内吸性，使得该产品毒性低，无残留，使用安全,在实际用量下对大多数作物无药害，且具有刺激作物生长作用。甲基立枯磷对半知菌类、担子菌细纲和子囊菌纲等各种病原菌均有很强的杀菌活性，对苗立枯病菌、菌核病菌、雪腐病菌等有卓越的杀菌作用；对马铃薯的茎腐病、黑斑病，棉花立枯病，甜菜根腐病,花生茎腐病,蔬菜苗期病害等十分有效；对稻、麦、棉、蔬菜瓜果等农作物的各种病害具有良好的防治效果，是替代常规杀菌剂的防治土传病害的优良药剂。

是防治土传病害杀菌剂

产品性能:本品是低毒有机磷杀菌剂，作用于菌类的细胞壁和细胞膜，在土壤中有一定的持效期，可用于防治棉花苗期病害和水稻苗立枯病，宜在病害初发期施药。

注意事项:1、产品在棉花上在每个作物周期多使用1次，在水稻每个作物周期多使用1次。2、建议与不同作用机制的其他杀菌剂轮换使用。3、本品对鱼类高毒，施药时要远离水产养殖区，严禁将药液倒入河塘等水体，不得在河塘等水体洗涤施药器械。本品对鸟类、蜜蜂中等毒，在蜜源作物花期禁止使用。使用时要注意对鸟类的影响。禁止在桑园、蚕室附近使用。用过的容器妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。4、本品不宜与酸、碱介质混用，以免分解失效。5、本品对眼睛和皮肤有轻微刺激性，施药要穿戴干净的防护服、手套等防护用品，顺风施药，避免吸入药液、避免与皮肤、眼睛接触，防止口鼻吸入。施药期间不得饮食或吸烟，严禁明火。施药后立即用肥皂和清水洗净脸、手和皮肤。

**中毒急救:**中毒症状表现为接触部位有轻微刺痛感，头痛、恶心等。本品低毒物质，皮肤接触，脱去被污染的衣物，用肥皂和水彻底清洗皮肤，眼睛接触，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。若吸入，立即脱离现场到空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如误食，应立即漱口，催吐，并送医院治疗，按有机磷农药中毒救治方法处理

**储存运输:**本品易燃，有挥发性，应存入于通风、干燥、阴凉、防雨处，严禁火源或热源，严防日晒，库温不宜超过30℃，应使用防爆的照明及通风等设备，并有接地装置，防止静电积累。要轻装轻卸，防止容易损坏，禁止使用易产生火花的设备和工具。置于儿童触及不到处，并加锁。勿与食品、饮料、饲料、粮食及氧化剂等易燃物同贮同运。

**使用说明:**棉花：苗期病害 拌种 1000-1500克/100千克种子；水稻：苗立枯病 苗床喷雾 2250-3300克/公顷 150-220克/亩  
1、用于防治水稻苗立枯病时，当苗床浇透水，播种、复土后，进行苗床喷雾，注意喷雾均匀。用于防治棉花苗期病害时，用本产品拌种，注意拌种时要均匀。  
2、本品在蜜源作物花期禁止使用，施药现场周围若有桑田，要避免药液飘移到上面，防止产生药害。  
3、大风天气或预计1小时内降雨，请勿施药。  
4、施药好在傍晚光照不强烈时进行，以免光照分解而降低药效。

**包装:**60克或100克/瓶\*40瓶/箱或包装:200公斤/桶