

杂交骡鸭苗 一点黑鸭苗 鸭苗养殖技术

产品名称	杂交骡鸭苗 一点黑鸭苗 鸭苗养殖技术
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	7.00/只
规格参数	中力家禽:1
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

骡鸭是经过人工授精出来的杂交品种，一般以花骡和肉骡居多，母鸭没有繁殖能力，只能人工授精，骡鸭属于瘦肉型鸭 花骡：花边鸭和樱桃谷肉鸭杂交出来的肉骡：白番鸭和樱桃谷肉鸭杂交出来的

冬季，对于肉鸭饲养管理要求较高，在北方地区较低温度达-20 左右，鸭舍内需要的温度与外界气温相差悬殊，由于商品肉鸭生长速度快，导致肉鸭对环境的适应能力和对疾病的抵抗力下降，同时易受饲料的质量等诸多因素的影响，造成肉鸭的饲料报酬降低、死淘率高，较终导致饲养肉鸭的收益降低。因此，养殖户科学饲养管理肉鸭十分重要。

过好育雏关

冬天育雏期长，特别要抓好1-7日龄幼雏期的管理。要有较宽裕的育雏房舍，加厚垫草，每平方米放20只左右，让雏鸭有较大的活动空间。要提前做好加温工作，进雏时保持32℃，以后每2天降低1℃左右，直至脱温。温度的控制，以雏鸭不聚堆为原则。温度适宜，采食力强，个体均匀，增重快。养鸭人员需经常观察鸭群情况，对挤堆的雏鸭要将其赶散，每20-30分钟要赶1次。要注意通风换气，室内应无刺激性气味。有阳光天气，要把雏赶到避风的地方放牧或晒太阳。要及时把个体较小、较弱的鸭挑出另群加强饲养，才能提高成活率和群体的均匀度。

提供清洁饮水

雏鸭出壳24-26小时要饮水，较好采用深井水或较温暖的自来水，可在水中投药防病。地上平养时较好采用流动水育雏。

注意饲喂卫生

饮水后1小时即可开食，开食后即可自由采食。不要突然变换饲料。喂料定时，不喂霉料，控制自由采食量，经常铲除料槽边角和底部的霉料(尤其是遇较长时间阴雨的时候)。

充分利用阳光

冬天要充分利用阳光。冬天的阳光能增加体温，节约能源，增加食欲，杀灭病原，提高抗病力。较好利用避风场地放牧或晒太阳，可以减少雏鸭腿部瘀血，有利于鸭群卫生，也有利于增重

创造良好的活动环境

创造一个让鸭群食饱就睡觉休息的良好环境。

清除鸭活动场地上的杂物，让活动场地充分暴露，通过阳光暴晒，达到消毒和清洁的目的。

整理运动场，包括填平洼地，清除积水，修复下水斜坡。由于水浪和鸭、鱼等活动使土坡日渐冲刷或崩塌，不便雏鸭上岸采食。因此，下水斜坡需要经常加以修整。有人用红砖铺砌，效果良好(特别是坡度较大的斜坡)。

勤清粪。积粪易造成运动场污染，影响鸭健康。要勤清粪，下雨前清扫，下雨后冲洗，保持鸭活动范围清洁干净。运动场较好选择或建成5-35度坡地，雨天不积水，易于清洗。

降低放养密度。降低放养密度有两个途径。一是单位面积少养一些；二是加大运动场地，自然降低了单位面积内的数量。

及时收集动物尸体，把场中的死鼠、死鱼、死鸭等动物尸体及时投入尸井或深埋。

注意防疫

特别要做好鸭肝炎、浆膜炎、流行性感胃和曲霉菌病的预防和免疫接种工作。不从外购入家禽及其产品。加强车辆和人员的消毒，尤其要加强鸭群和笼具的消毒，工作完成后立即对场地进行彻底的消毒。

联系人：崔经理