

山东华阳菜草通除草剂

产品名称	山东华阳菜草通除草剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

山东华阳菜草通——二甲戊灵33%大蒜、姜田、苗前封闭除草剂

规格：250毫升*20瓶

农业登记证号：PD20082217

生产许可证号：农业生许（鲁）0081

产品标准证号：GB/T22176-2008

生产厂家：山东华阳农药化工集团有限公司

【作用特点与防治对象】

本剂是二硝基苯胺类芽前选择性除草剂，亦作烟草腋芽抑制剂，主要是抑制分生组织细胞分裂，在杂草种子萌发过程中幼芽、茎和根吸收后，抑制幼芽和次生根的形成。选择性除草剂，防除一年生禾本科和某些一年生阔叶杂草。禾谷类作物、玉米和水稻播种后芽前施用，或在蚕豆、棉花、花生和大豆芽前浅混土施用。蔬菜田中可芽前或移栽前施用，也可用于烟草抑芽。

【登记作物】

作物名称	防治对象	制剂用药量	使用方法
蒜田	一年生杂草	130-150毫升/亩	播后苗前土壤喷雾
姜田			
花生田	150-200毫升/亩		
甘蓝保护地	100-150毫升/亩		
棉花			
水稻旱育秧田			

烟草	抑制腋芽	0.2-0.25毫升/株	杯淋法
----	------	--------------	-----

【推荐使用作物】

作物名称	防治对象	制剂用药量	使用方法
韭菜田	100-150毫升/亩	播后苗前土壤喷雾	
马铃薯田	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	200-300毫升/亩	
春玉米			
夏玉米	150-200毫升/亩		

【施用技术】

1. 33% 菜草通EC：用于旱田作物除草时，应于播后苗前进行土壤均匀喷雾。如姜田、蒜田一年生杂草，花生田、棉花田一年生杂草，甘蓝（保护地）一年生杂草。
2. 33%烟草抑芽剂EC：在烟株现芽2周后打顶，同时将2厘米长的腋芽全部抹去，之后用杯淋法施药1次。
3. 30%齐田SC：防治甘蓝、韭菜一年生杂草，有效成分用量630 - 765克/公顷；防治夏玉米一年生杂草，有效成分用量900 - 1125克/公顷。
4. 大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

【注意事项】

1. 本品在烟草上使用的安全间隔期为40天。每个作物周期的最多使用次数为1次；在其他作物上，每个作物周期的最多使用次数为1次。
2. 采用播后苗前施药时，在种子播种后覆土3-4厘米，然后施药，避免种子和施药土壤层接触。
3. 有机质含量低的沙壤土，可选用低剂量；有机质含量超过2%的壤土选用高剂量，施药后不宜混土。
4. 在低温情况下或施药后下大雨可能会使作物产生轻微药害或影响药效，施药后2天左右，表土干旱也会影响药效。
5. 本剂防除单子叶杂草比双子叶杂草效果好，在双子叶杂草较多的田块，应与其他除草剂混用。
6. 使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。
7. 本剂对鱼类有毒，应避免污染水源。
8. 孕妇及哺乳期妇女避免接触。

9.用过的包装物应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

【中毒急救】

中毒症状表现为有中等刺激作用。不慎吸入，应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛，应用大量清水冲洗至少15分钟。误服则应立即携此标签将病人送医院诊治，对症治疗。若大量摄入清醒时可引吐。本剂无特效解毒剂，若大量摄入后病人清醒，可以立即引吐。请医生对症治疗。