

攀枝花出壳白鹅供应 出壳大白鹅

产品名称	攀枝花出壳白鹅供应 出壳大白鹅
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

本公司长期出售各种鹅苗：朗德鹅、麻鹅、三花鹅、大白鹅、杂交白鹅等技术支持，帮忙销！让您没有后顾之忧！饲养小鹅的要点

一、选好雏鹅。健壮雏鹅表现为举止活泼，眼大有神，反应灵敏，卵黄收缩良好，毛干后能站稳，叫声有力，用手握住颈部提起来时，双脚迅速收缩。对腹大、歪头等弱雏要淘汰。二、温度适宜。1-5日龄为25-28℃，6-10日龄为23-26℃，11-20日龄为20-24℃，21日龄以后为17-20℃。三、精心饲喂。应定时定量饲喂，宜采用少喂勤添八成饱的喂法。雏鹅在出壳24小时后，要先喂水后开食，喂浸泡的碎米和丝状青菜。开食后头两天喂4-5次，4-10日龄喂次数增至5-7次，日粮精料占35%，青菜占65%。11-20日龄时，以青料为主。21日龄后，改为谷物类饲料，每天喂4-5次。四、分开育雏。每批雏鹅都有大、中、小或强弱之分，因此，**合理分群，达到全群生长均匀，发育整齐的目的。育雏应以小群为宜，每群50-80只，要做到白天、黑夜逐群检查，用手把小鹅操动4-5次，防止有雏鹅堆叠而造成上面冻、中间热、下面压的现象。五、适时放牧。自开食后，要每隔一小时起身一次，这样可调节温度，散发水汽。7日龄后，选择在晴朗无风天气，可在清洁的浅水塘内进行放水，开始时间要短，路要近。六、医治**。雏鹅抗病力弱，圈舍要常清扫，垫草要勤换勤晒，料槽每周用碱水刷1次，育雏阶段医治小鹅和小鹅瘟。小鹅的保温技术 雏鹅调节体温能力弱，饲养中应严格控制温度、湿度。保温期的长短因品种、气温、日龄和雏鹅的强弱而异，一般需保温23周。适宜的育雏温度是15日龄为28.27℃，610日龄为26.25℃，1115日龄为24.22℃，1620日龄为22.20℃，20日龄以后为18℃。温度是否合适，可通过观察雏鹅表现来了解，当雏鹅拥挤成堆，不吃食，说明是怕冷，温度偏低，此时除增温外，还应用手拨散雏鹅，使之活动，防止被压死。如雏鹅张口呼吸，叫声高而短，饮水量增加，说明受热，温度偏高，应增加饮水，及时适当降温。当雏鹅伸腿，三五成群，静卧无声或有规律吃食饮水、排泄粪便，间隔10-15分钟运动一次，是温度适宜的具体表现。 鹅舍湿度对雏鹅的健康和生长也很重要，一般要求相对湿度维持在60%-65%。湿度过大，温度低，小鹅易患呼吸道**和腹泻；湿度过大，温度偏高，小鹅易“出汗”，食欲减少，抗病力降低。所以，雏鹅饮水时（因鹅是水禽，有戏水习性），要使雏鹅不入水槽，水不沾身，不洒水于地面上，保持鹅舍干燥。雏鹅舍内的垫草或锯末23天应更换一次。小鹅不吃食的原因 有可能是你喂的饲料对于小鹅来说是不适口的，你可以喂它一些拌水的小米或者是煮熟的。雏鹅日粮以青菜为主，另外可加入米饭或煮的玉米渣。喂食时，把干净的菜叶撒在草席或碟子中，让小鹅自由采食。不会采食的可把菜叶送到它的嘴边或者撒在鹅身上，引诱其采食。1~4日龄的小鹅，消化力弱，每日喂5~6次即可。4日龄后，食量和饲喂次数应逐渐增加，每日喂8次，每次喂7~8成饱。过食会引起消化不良。如果想要小鹅吃饲料的话，你可以把青菜切碎，先慢慢的往青菜里面加点饲料，看看小鹅吃不吃。如果小鹅吃，你可以每次

在青菜里面加饲料，饲料的量要慢慢的变多，这样就相当于饲料驯化小鹅

联系人：白经理

本公司以品质优胜，诚信为本，服务至上的宗旨