

# 陶氏益农盖草能——白菜西瓜花生大豆苗木禾本科杂草除草剂

产品名称	陶氏益农盖草能——白菜西瓜花生大豆苗木禾本科杂草除草剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

## 产品详情

### 陶氏益农盖草能——白菜西瓜花生大豆苗木禾本科杂草除草剂

规格：15ml\*400袋；20ml\*250袋；100ml\*50瓶

有效成分含量：108克/升

农药登记证号：PD20081980

农药生产许可证号：农药生许（苏）0077

产品质量标准号：Q/3201 FLAG007-2019

生产厂家：美国陶氏益农公司

分装单位：江苏省农垦生物化学有限公司

剂型：乳油

产品性能（用途）：本品是苗后茎叶处理除草剂。可用于大豆、棉花、花生、油菜、甘蓝、马铃薯、西瓜和向日葵等作物田中防除看麦娘、稗草、马唐、狗尾草、牛筋草、野燕麦、芦苇等一年生禾本科杂草，在正常情况下使用，对阔叶作物安全，低温条件下效果稳定。

使用技术和使用方法：

作物（或范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
春大豆田	芦苇	60-90毫升/亩	茎叶喷雾

大豆田	一年生禾本科杂草	30-45毫升/亩
甘蓝田		30-40毫升/亩
花生田		20-30毫升/亩
马铃薯田		35-50毫升/亩
棉花田		25-30毫升/亩
西瓜田		
向日葵田		60-100毫升/亩
油菜田		28-37毫升/亩

注：（1）公顷用制剂量=亩用制剂量×15

（2）总有效成分量浓度（毫克/千克）=（制剂含量×1000000）÷制剂稀释倍数

（3）1.本品用于防除禾本科杂草时，于杂草3-5叶期施药，每亩用水量15-30升，细雾滴均匀茎叶喷雾。2.气候干旱情况下及杂草较大时使用登记批准的高剂量。3.避免中午高温时施药，大风天或降雨前，勿施药。4.施药1小时后降雨对药效无影响。5.本品对禾本科作物玉米，水稻和小麦敏感，施药时应避免药雾飘移到上述作物之上，以防产生药害。

注意事项：1.每季多使用1次。不建议与阔叶除草剂混用。2.使用本品时应穿戴适合的防护服.戴口罩.手套等用具，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水等。施药后应及时和洗脸。3.本品对鱼类等水生生物有毒，应远离水产养殖区施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具。废弃物应妥善处理，不可作他用，也不可随意丢弃。4.与禾本科作物期间.混.套种的田块，不能使用本品。5.请严格按照标签说明使用。如需业务和技术上的支持，请即与本公司客户服务中心联系。如果您要将本产品用于出口农产品，请参照相应进口国的相关标准使用。6.避免孕妇及哺乳期的妇女接触。

中毒急救：1.中毒症状：吸入要害。造成轻微皮肤刺激。造成严重眼损伤。可能导致皮肤过敏反应。2.眼睛接触：保持眼睛张开，用水缓慢淋洗15到20分钟。如戴隐形眼睛并可方便取出，冲洗5分钟后，取出隐形眼镜。继续冲洗。如出现不适，就医诊治。3.误食：请立即通知中毒控制中心或医生。除非医生或中毒控制中心告知，请勿催吐。勿给患者任何液体饮料。勿给失去知觉的人喂食任何东西。4.皮肤接触：脱掉受污染衣物。用大量肥皂和清水淋洗。如出现不适，就医诊治。5.误吸：转移至空气清新处，如无自主呼吸，请呼叫救护车并给予人工呼吸。如果采用口对人工呼吸，需使用救护人员保护装备（袋装面罩等）。就医诊治。如果出现呼吸困难，应该由人员给予输氧。6.给医护人员的提示：无特殊解毒药，由医生对症治疗。就医时，请携带此产品包装或标签。

如遇到与本公司产品有关的紧急情况，请立即拨打24小时热线电话寻求援助：（021）5838 2516

储存和运输：1.本品应密封贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。

2.存放儿童触及不到之处，并加锁。

3.勿与食品、饮料等其他商品同贮同运。贮存或运输时堆层不得超过规定，注意轻拿轻放，以免损坏包装，导致产品泄漏。

4.为保持产品质量，建议存储温度>-10 ° C。