

苄二氯——高羊茅早熟禾黑麦草禾本科科草坪除草剂

产品名称	苄二氯——高羊茅早熟禾黑麦草禾本科科草坪除草剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

苄二氯——高羊茅早熟禾黑麦草禾本科科草坪除草剂

规格：40g × 100袋

产品性能（用途）：

本产品是由二氯喹啉酸与苄嘧磺隆复配而成，二氯喹啉酸属激素型的喹啉酸类除草剂，芽后使用，可有效防除稗草；苄嘧磺隆属磺酰脲类除草剂，对大多数一年生和多年生杂草和莎草科杂草的防效较高，但对禾本科杂草防效不理想。

使用技术和使用方法：

作物（或范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻抛秧田	一年生及部分多年生杂草	40克-50克/亩	茎叶喷雾
水稻秧田	35克-50克/亩		

1、应在稻苗二叶一心后施用，稻苗2.5叶期前太小时易伤苗。

2、胡萝卜、芹菜和香菜等相对敏感，药液漂移物对相邻田块的这些作物易产生药害，施药时应注意。

经过多年试验，苄二氯可用于禾本科草坪防除阔叶杂草和莎草科杂草，对冷剂型禾本科草坪安全。初次使用应先做小面积试验，确认安全后再大面积使用。

注意事项：

1、施药时应注意安全防护。禁止在河塘等水体中清洗施药器具。

2、对伞形花科作物，如胡萝卜、芹菜和香菜、茄科如番茄等相当敏感，药液飘移对相邻田块的这些作物易产生药害，施药时应注意。

3、使用过的喷雾器，应清洗干净方可用于阔叶作物喷其它的农药。

4、使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。

5、孕妇、儿童应远离本品。

中毒急救：

不慎吸入，应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛，应用大量清水冲洗至少15分钟。误服则应立即携此标签将病人送医院诊治，不能引吐。

储存和运输：

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童触及不到之处，并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。