

# 高效氯氰菊酯—蔬菜果树地下害虫花卉植物土壤杀虫剂

产品名称	高效氯氰菊酯—蔬菜果树地下害虫花卉植物土壤杀虫剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

## 产品详情

高效氯氰菊酯—蔬菜果树地下害虫花卉植物土壤杀虫剂

规格：100g\*40瓶

产品性能（用途）：

本品生物活性较高，击倒速度较快，对害虫具有触杀、胃毒作用。对棉花、柑橘、蔬菜、茶树、烟草等作物的害虫有较好的防治效果。

作物名称	防治对象	制剂用药量	使用方法
蔬菜	菜青虫、小菜蛾	15-40毫升/亩	喷雾
	菜蚜	5-27毫升/亩	
棉花	棉铃虫、棉蚜、红铃虫	22-45毫升/亩	
柑橘	浅叶蛾	2250-3000倍液（稀释倍数）	
	红蜡蚧	900倍液（稀释倍数）	
烟草	烟青虫	20-40毫升/亩	
苹果树	桃小食心虫	1350-2250倍液9（稀释倍数）	
茶树	茶尺蠖	22-40毫升/亩	
小麦	蚜虫	20-30毫升/亩	

注：（1）公顷用制剂量=亩用制剂量\*15

（2）总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量\*1000000÷制剂稀释倍数)

1、本品应于蔬菜菜青虫、小菜蛾三龄幼虫期、蚜虫盛发期，棉花红铃虫产卵盛期、棉铃虫幼虫盛期，蚜

虫发生期、柑橘潜叶蛾幼虫期、红蜡蚧若虫盛发期，烟草烟青虫盛发期，苹果树桃小食心虫卵孵盛期，茶树茶尺蠖幼虫盛发期，小麦蚜虫始发期施药。

2、大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

注意事项：

1、安全间隔期：蔬菜为7天，每季多使用4次；棉花为7天，每季多使用3次；柑橘为40天每季多使用3次；烟草为15天，每季多使用2次；苹果树为21天，每季多使用4次；茶树为10天，每季多使用1次，小麦上不少于31天，每季多使用2次

2、本品对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒，施药期间应避免对周围蜂群的影响，蜜源作物花期、蚕室和桑园附近禁用。远离水产养殖区施药、禁止在荷塘等水体中清洗施药器具，避免污染水源。

3、本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。

4、使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西饮水。施药后应及时洗手和洗脸。

5、孕妇及哺乳期妇女避免接触。

6、建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用，以延缓抗性产生。

7、用过的包装物应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

中毒急救：

中毒表现症状：属神经毒剂，接触部位皮肤感到刺痛，尤其在口、鼻周围但无红斑。接触量大时会引起头痛、头昏、恶心、呕吐、双手颤抖，全身抽搐或惊厥、昏迷、休克。不慎吸入，应将病人移至空气流通处。不慎将接触皮肤或溅入眼睛，应用大量清水冲洗至少15分钟。误服则应立即携此标签将病人送医院治疗；大量吞服时可洗胃，不能催吐。洗胃时，应注意保护气管和食管。

储存和运输：

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童触及不到之处，并加锁。勿于食品、饮料、饲料、粮食等其他商品同贮同运。