

75%百菌清——蔬菜花卉果树白粉病 霜霉病 叶斑病广谱型杀菌剂

产品名称	75%百菌清——蔬菜花卉果树白粉病 霜霉病 叶斑病广谱型杀菌剂
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

75%百菌清——蔬菜花卉果树白粉病 霜霉病 叶斑病广谱型杀菌剂

产品规格：80g × 100袋

产品性能（用途）：

百菌清能与真菌细胞中的3-磷酸甘油脱氢酶的半胱氨酸的蛋白质结合，破坏细胞新陈代谢而丧失生命力。其主要作用是预防真菌侵染，没有内吸传导作用，但在植物表面有良好的粘着性，不易受雨水冲刷，有较长的药效持效期。

使用技术和使用方法：

作物（或范围）	防止对象	制剂用药量	
果菜类蔬菜	多种病害	1500-3199.95克/公顷	100-213.33克/亩
叶菜类蔬菜	白粉病、霜霉病	1659-2295克/公顷	113-153克/亩

瓜类	1605-2205克/公顷	107-147克/亩	
梨树	斑点落叶病	500倍液	
苹果树	白粉病、黑痘病	600-700倍液	
葡萄			
柑橘树	疮痂病	833-1000倍液	
花生	锈病、叶斑病	1500-1800克/公顷	100-120克/亩
豆类	炭疽病、锈病	1695-3090克/公顷	113-206克/亩
水稻	稻瘟病、纹枯病	1500-1905克/公顷	100-127克/亩
小麦	叶斑病、叶锈病	600-800倍液	
茶树	炭疽病		
橡胶树	500-800倍液		
使用方法		喷雾	

注：（1）公顷用制剂量=亩用制剂量 × 15

（2）总有效成分量浓度值（毫克/千克）=（制剂含量 × 1000000）÷ 制剂稀释倍数）

1.为达到良好的防治效果，应在发病前或发病初期施药，视病害发生情况，每隔7天左右施药一次，可连续用药2-3次。施药时要喷匀喷透。

2.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药

注意事项：

本产品茶树、水稻、叶菜类上使用安全期间间隔期为10天，在豆类、小麦上为42天，在柑橘，葡萄上为21天，在瓜类上为14天，在番茄上23天，在黄瓜上为27天，在花生上为27天，在梨树上为25天，在苹果树上为20天，每个作物周期多施药次数分别为：花生、苹果树和葡萄上4次，梨树上6次，早稻上3次，晚

稻上5次，黄瓜上3次，番茄上6次，柑橘树上3次。2、配药时，配药人员要戴皮胶手套，口罩，必须按规定的剂量称取药粉，不得随意增加用量，严禁用手拌药。3.不能与石硫合剂，波尔多液或碱性的农药等物质混用。4.梨.柿.桃.梅和苹果树等使用浓度偏高发生药害：与杀螟松混用，桃树易发生药害，与炔螨特，三环锡等混用时，茶树会产生药害。5施药结束后，及时将喷雾器清洗干净，然后应马上用清水冲洗受药液污染的身体部位。清洗药械的污水应选在安全的地点妥善处理，不准随地泼洒，防止污染饮用水源和养鱼池塘。6.施药人员要注意个人防护，穿戴防护服，胶鞋，口罩，手套。等在操作时禁止吸烟，喝水，吃东西，不能用手擦嘴，脸，眼睛。工作后要用肥皂洗手，脸，并漱口，洗澡，被农药污染的工作服要及时换洗，施药人员每天喷药不超过6小时，患皮肤病及其他疾病尚未恢复健康者。及哺乳期，孕期，经期的妇女停止喷药。7.对鱼有毒，远离水产养殖区用药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具，避免药液污染水源地。8.建议与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用，以延缓抗药性。9盛过农药的包装箱，瓶，袋要集中妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

中毒急救：

不慎吸入，应将病人移至空气流通处。皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用肥皂和大量清水冲洗彻底清洗受污染的皮肤15分钟。眼睛溅药：立即将眼睑翻开，用清水冲洗15分钟，在请医生诊治。操作人员如有头痛，头昏，恶心，呕吐等症状，应立即离开施药现场，脱去污染的衣服，漱口，擦洗手，脸和皮肤等暴露部位，并及时到携本标签送到医院对症治疗。如误服中毒应立即催吐，导泻，及时携本标签将病人送医院对症治疗。

储存和运输：

1.贮存，运输时，严禁日晒，雨淋。不能与食品，饮料，食具，饲料，种子等同贮同运。2.本品贮存于阴凉，干燥及时通风良好的场所中，注意防潮，远离火源或热源。3.药品应贮存在儿童接触不到的地方。并加锁。