

汉阳灭白蚁 防治白蚁 新科白蚁防治

产品名称	汉阳灭白蚁 防治白蚁 新科白蚁防治
公司名称	武汉新科白蚁防治有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌东湖花苑新8栋2单元602室
联系电话	18507132911 18507132911

产品详情

工蚁和兵蚁无翅，虽有两性，但生育能力早期即受抑制，某些种类的工蚁或兵蚁可再分为双态或多态。工蚁在群体中数量多，防治白蚁，约占80%以上，体柔软，除某些高等白蚁外，几乎无色素，无眼或仅存痕迹，在群体中担负取食、筑巢、修路、运卵、抚育幼蚁、饲喂蚁后、兵蚁和幼蚁等工作，(见社会行为)。兵蚁头部有圆形、卵圆形、近乎方形或长方形等，有色素，高度骨化，上颚发达，根据上颚形状，可分上颚兵与象鼻兵两大类，无眼或仅存痕迹，专司捍卫群体，约占群体的5%左右，上门灭白蚁，少数种类缺兵蚁。繁殖蚁头圆形或卵圆形，有一对复眼，复眼的背方或背前方有一对无色透明的单眼，触角9~32节，念珠状，咀嚼式口器。胸、腹部黄至暗棕色，没有如蚂蚁的“狭腰”。翅膜质，不飞时平叠于体背，超过体长，前后翅略等，靠近翅基有一横缝，称为“肩缝”，飞翔脱翅后，翅基部残存翅鳞。原始繁殖蚁通常一对，是由有翅成虫经群飞、脱翅配对后发展而来，装修防白蚁，俗称蚁王和蚁后，它们居住在特定的“王室”里，专司交配产卵。蚁王体形变化不大，色泽加深；蚁后的腹部因怀卵逐渐变得异常膨大，如黑翅土白蚁蚁后体长可达8厘米。蚁后产卵能力高，某些土白蚁一昼夜能产卵4000~5000粒，多的可达1~2万。在家白蚁和散白蚁属的群体中，都曾发现一王多后或多王多后现象，此种情况以出现补充型繁殖蚁时为常见。

若蚁

若蚁指从白蚁卵孵出后至3龄分化为工蚁或兵蚁之前的所有幼蚁。有些种类缺少工蚁，由若蚁代行其职能。

白蚁属于渐，为有翅成虫，气候条件适宜时，由巢内成群飞出扩散移殖，这个过程称为“群飞”。白蚁活动有明显的季节性，在长江流域，一般3~11月活动比较显著，大多数种类畏惧光亮，筑巢和活动地点都以阴暗之处居多。无发声器官，但靠头部打击基质而引起振动，发出一定频率的声讯号，藉以传递信息。此外，由工蚁腹板腺分泌的跟踪外激素，有诱引同种白蚁跟踪而行、寻觅食物、探索方向的作用。白蚁按栖性可分3类：木栖性白蚁在木材或树干中蛀成不规则的隧道，与土壤基本上没有直接联系；土栖

性白蚁依土筑巢，专门在地下活动，或虽能在地面活动，但仍与地下蚁巢有密切联系；土木两栖性白蚁可在土中筑巢，也可在木材中筑巢，巢位可在地下，也可在地上。中国云南、广西和海南已发现5种筑垄白蚁：云南土白蚁和土垄大白蚁能筑一至数米高的大型垄巢；大锯白蚁所筑的硬垄坚如磐石；黄球白蚁的垄巢耸立地面，如孤峰突起；五指山歪白蚁在草丛中筑小型土垄。在非洲、南美洲和澳洲的热带森林和草原上，有圆锥状、馒头状、蘑菇状等各种白蚁土堡，如澳洲北部的一种弓白蚁，汉阳灭白蚁，筑高而长的楔形垄巢，有规律地朝南北指向，有“罗盘白蚁”之称。

（一）生态防治法

生态防治法是在建筑物、水利工程开工前、施工中、竣工后交付使用的长时间内和一系列的种植业工作中，根据防治白蚁的要求，采取各项必要的措施或开展各项活动，创造不利于白蚁滋生的环境，使建筑物、土质堤坝和农林作物等免遭白蚁危害的一类防治方法。

（二）生物防治法

以自然界存在的种间斗争和白蚁与真菌的关系为基础，利用白蚁的天敌来防治白蚁和利用真菌指示物找巢的方法。

汉阳灭白蚁-防治白蚁-新科白蚁防治(推荐商家)由武汉新科白蚁防治有限公司提供。汉阳灭白蚁-防治白蚁-新科白蚁防治(推荐商家)是武汉新科白蚁防治有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。