

独杆月季树 春诚月季3到10公分 独杆月季树基地

产品名称	独杆月季树 春诚月季3到10公分 独杆月季树基地
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方城县春诚月季种植基地

叶黄有黑点，是患了黑斑病，是由于放置地点闷热不通风、盆土过湿、浇水太多、排水不良所造成的。由于盆土经常过湿，根部呼吸困难，又造成“”，使花苞枯萎而掉落。挽救办法：摘去部分发黄有黑点的黄叶，用火烧掉，以防病菌蔓延。喷洒多菌合剂等2-3次。要放置在光照充足、通风好的地方，独杆月季树供应，盆土保持见干见湿.切忌过湿，排水要通畅。

月季修剪是一项重要作业，独杆月季树基地，除休眠期修剪外，生长期还应注意摘芽、剪除残花枝和砧木萌蘖。每批花谢后，及时将与残花连接的枝条上部剪去，不使其结子消耗养料，保留中下部充实的枝条，促进早发新枝再度开花。

除重施基肥外，生长季节还应追肥，需在花后追施性氮肥以壮苗催花;月季对水要求严格，不能过湿过干，过干则枯，独杆月季树种植基地，过湿则伤根落叶。

蛀茎害虫的防治方法结合修剪，在产卵裂口处压破卵粒和初孵幼虫，并及时剪去病虫枝及虫害的嫩梢。在幼虫孵化期喷20%的杀灭菊酯3 000倍液，独杆月季树，或40%2 500倍液，保护利用寄生蜂。

卷叶虫的防治方法人工捕杀幼虫，或用40%氧化2 500倍液，或90%晶体1 000倍液喷杀。

生产上普遍采用扦插、水平压条、高空压条、嫁接、分株等无性繁殖方法，有条件的用组织培养繁殖则更好。

扦插可用硬枝插和绿枝插，还可用水插。水插是用透光白瓶，保持水温20?25T，插枝要固定在水中。扦插系列通常在春季或夏初温度在15?25T时，也可在秋季8?10月进行。

独杆月季树-春诚月季3到10公分-独杆月季树基地由方城县春诚月季种植基地提供。行路致远，砥砺前行。方城县春诚月季种植基地致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。