

## 2公分独杆月季树基地 2公分独杆月季树 春诚月季现选现挖

产品名称	2公分独杆月季树基地 2公分独杆月季树 春诚月季现选现挖
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方城县春诚月季种植基地

在月季休眠期间进行重剪，选择春夏季节长出的粗壮花枝.从基部向上保留2-3个芽，其余全部剪去。修剪时一般弱枝强剪.强枝弱剪，留外侧芽，使枝条高度一致，分布均匀，开花整齐。月季是在新枝上开花的，所以每次开花后必须修剪，促使早生新枝，2公分独杆月季树基地，开第2次花。在花枝基部上面10厘米左右，剪去上部枝条及残花，减少养分的消耗，增强新枝长势。生长期间，对着生内向的花芽、过密的幼芽应及时摘除，以均花势。非聚花品种.顶端出现多蕾时，只留主蕾1个，其余均摘除。由不定芽萌发的徒长枝和从砧木上萌发的芽，也要及时抹掉，以免消耗养料。

有些初学养花者，未能掌握月季的施肥技术，施肥后引起了月季的新梢和嫩叶卷曲，甚至枯萎，以致不能长出花枝，2公分独杆月季树种植基地，严重时还导致了植株。这是由于施肥的时间和施出量的不恰当而引起的。因为月季刚生出的嫩根受到浓肥刺激时，会引起萎缩，从而导致新梢嫩叶卷曲枯萎。只要不在月季旺发新根期间施用浓肥，就可以避免这种现象发生。

月季是先根后叶，月季在早春和每次花后，地下部分都要旺发新根，地上部分也要萌芽长枝，而且是根先于芽生长。只要看到新芽萌动发梢时，即是地下旺发新根期，就不应施肥，更忌施用浓肥，必须等到新梢上的叶片放平、泛绿后，才能施用较稀薄的液肥。随着新梢、新根不断生长健壮，耐肥力也相应

增强，施肥的浓度才能相应增加。在新梢停止生长到下次新芽萌动之前的一段时间，2公分独杆月季树供应，月季的耐肥力较强，是施肥的时期。此时可充分施用一些浓度较高的肥料，以满足其生长、开花及下次萌芽、长枝所需养分，且能防止长势，并开出丰满的花朵。

玫瑰和月季是同科同属不同种的姊妹花，均为蔷薇科蔷薇属植物。很多人都搞不清楚二者的区别，通过实物对比，其实很容易分辨。玫瑰

玫瑰和月季是同科同属不同种的姊妹花，均为蔷薇科蔷薇属植物。很多人都搞不清楚二者的区别，通过实物对比，其实很容易分辨。玫瑰和月季的主要区别如下：

花的颜色 玫瑰花色单一，紫红色(所谓的玫瑰红)较多，白色也有;月季花色繁多，有粉、紫、黄和绿等色，各色有深浅之分，有的还具条纹及斑点或复色，可谓五彩缤纷。

2公分独杆月季树基地-2公分独杆月季树-春诚月季现选现挖由方城县春诚月季种植基地提供。方城县春诚月季种植基地在花木这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春诚月季一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：雷经理。同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。