

武汉新科白蚁防治 武汉白蚁防治

产品名称	武汉新科白蚁防治 武汉白蚁防治
公司名称	武汉新科白蚁防治有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌东湖花苑新8栋2单元602室
联系电话	18507132911 18507132911

产品详情

繁殖

白蚁的巢群中一般只有一对原始型蚁王和蚁后，某些白蚁种类也有出现多王多后的现象，一旦原始型蚁王、蚁后体弱病死后，巢群内会迅速产生短翅补充型或无翅补充型的蚁王、蚁后，继续延续巢群的繁殖后代，扩展群体的需要。如土栖白蚁群体内的壮年蚁后，在其生殖的鼎盛时期，一昼夜内约产8000粒-10000粒蚁卵，一生中的产卵量高达5亿多粒，这类白蚁的一个成熟的巢群个体数可达数百万头，并延续其几十年的生活史，其种群个体数量的增长可以用呈几何级数出现来描述。

白蚁是动物世界的建筑大师，它们建造的标志性土丘高度可达到10英尺（约合3米）以上，照片中的土丘高度达到16英尺（约合4.8米）。这种“摩天楼”采用白蚁嚼碎的树枝、泥土和粪便建造，内部环境非常舒适。白蚁建造的土丘通风堪称，犹如安装空调一般，同时也可收集冷凝的水滴；一些蚁穴1内甚至还建有“真1菌农场”。

白蚁能在极干燥的木材中存活，其具有3对直肠腺体，能够吸收粪便的水分。代谢慢，繁殖能力差，白蚁无法与鼻白蚁及大白蚁竞争，在优良的环境中不易生存，居于干硬的木材。白蚁有嫁私白蚁的称呼，当其量大被发现时，家具早已损坏。

白蚁原本是等翅目昆虫，2007年，等翅目撤销，被归入蜚蠊目，换句话说，白蚁是社会性的蟑螂，而不是蚂蚁。为喜温昆虫，分布以赤道为中心，向南北展开，纬度越低，种类越多。其分布范围古北区北界为45°N，武汉白蚁防治，新北区为52°30'N，新热带区南界为45°25'S。中国除黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、青海和新疆尚未发现外，其余各省区都有分布和为害。其中，散白蚁分布北界约为40°N，土白蚁为35°N，家白蚁为32°~33°N，堆砂白蚁28°N左右。中国长江以南，种类多，密度大，南

岭以南湿热地区是为害的猖獗区。能蛀食多种大田作物、经济作物、林木、果树和种苗。

武汉新科白蚁防治有限公司拥有先进的科研设备、严格的检测手段，特别是对于高层建筑房屋、仓库和埋地电缆的家白蚁及危害堤防水库、园林绿化、果药园的土栖白蚁，除巢技术方面技术方面在享有很高盛誉。欢迎新老朋友来电咨询业务

工蚁和兵蚁无翅，虽有两性，但生育能力早期即受抑制，某些种类的工蚁或兵蚁可再分为双态或多态。工蚁在群体中数量多，约占80%以上，体柔软，除某些高等白蚁外，几乎无色素，无眼或仅存痕迹，在群体中担负取食、筑巢、修路、运卵、抚育幼蚁、饲喂蚁后、兵蚁和幼蚁等工作，(见社会行为)。兵蚁头部有圆形、卵圆形、近乎方形或长方形等，有色素，高度骨化，上颚发达，根据上颚形状，可分上颚兵与象鼻兵两大类，无眼或仅存痕迹，专司捍卫群体，约占群体的5%左右，少数种类缺兵蚁。繁殖蚁头圆形或卵圆形，有一对复眼，复眼的背方或背前方有一对无色透明的单眼，触角9~32节，念珠状，咀嚼式口器。胸、腹部黄至暗棕色，没有如蚂蚁的“狭腰”。翅膜质，不飞时平叠于体背，超过体长，前后翅略等，靠近翅基有一横缝，称为“肩缝”，飞翔脱翅后，翅基部残存翅鳞。原始繁殖蚁通常一对，是由有翅成虫经群飞、脱翅配对后发展而来，俗称蚁王和蚁后，它们居住在特定的“王室”里，专司交配产卵。蚁王体形变化不大，色泽加深；蚁后的腹部因怀卵逐渐变得异常膨大，如黑翅土白蚁蚁后体长可达8厘米。蚁后产卵能力高，某些土白蚁一昼夜能产卵4000~5000粒，多的可达1~2万。在家白蚁和散白蚁属的群体中，都曾发现一王多后或多王多后现象，此种情况以出现补充型繁殖蚁时为常见。

武汉新科白蚁防治(多图)-武汉白蚁防治由武汉新科白蚁防治有限公司提供。武汉新科白蚁防治(多图)-武汉白蚁防治是武汉新科白蚁防治有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。