

信阳古桩月季品种「在线咨询」

产品名称	信阳古桩月季品种「在线咨询」
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

树状月季关键病害防治

提升树状月季种植管理方法，避免偏施基肥；春、夏梢抽发期和花瓣完善前，可采用代森锰锌、松树枝酸铜、代森锌、百菌清等喷布树干，半个月上下喷一次，持续3-4次。

树状月季脚腐病

立即排水管道，改进园里透光性自然通风标准，提升对天牛和别的的树杆虫害的防治；对已感病主茎，可用抗病性粘木接换砧。药剂避免：刮除病斑后上药，常见药剂有三、托布津等。

螨类

（柑橘飞虱、四斑黄搜索引擎蜘蛛锈壁虱）。盛开前后左右（3-5月）和秋天（9-11月）是防治飞虱的关键阶段：花时虫口相对密度达1-2头/叶，花谢和秋天达5-6头/叶即需开展防治。常见药剂有螨酮、达螨灵、炔螨特、螨酯、双甲咪等，留意维护长须螨、钝螨、食螨瓢虫、日己方头甲和草蛉等克星。

蚧类

（矢尖蚧、红蜡蚧、吹棉蚧等）。防治关键阶段：矢尖蚧为第yi代幼虫期，红蜡蚧为幼虫期很多上梢危害阶段（一般为5月上、中下旬至6月中下旬），吹棉蚧为幼虫盛发环节。常见药剂阴啉酮、杀扑磷、碱、乐斯本、汽车机油溶剂等。留意改进园里自然通风透光性标准；维护和运用日己方头甲、小红点唇瓢虫、草蛉、金子蚜小蜂、澳大利亚瓢虫、大红色瓢虫等克星。

潜叶蛾

防治的关键阶段为夏、秋梢抽发期（7月上旬）。立即清掉零星抽发的夏秋季梢，融合液肥管理方法，促

进主茎抽发的新梢健硕齐整。药剂防治：新梢抽发至1-2cm时打药，7-10天喷一次，持续2-3次。常见药剂有阿维菌素、杀螟丹、氯氟菊酯等。

天牛类

5-8月，大晴天下午人力星天牛和绿桔天牛若虫，黄昏褐天牛若虫；立即消除幼虫、初孵幼虫和剪去受害枝杈；用棉絮或纯棉纱淋湿等灭虫剂吡菌胺后阻塞虫孔，再将虫孔用土壤封闭式，以幼虫。

一、土质要求：土壤是土质疏松的微酸性土质（PH值6.5左右）为佳，碱性大的土质，可用处理，栽植前施足基肥（有机肥、无机肥均可），以园土30%、塘泥30%、腐植质土30%、细煤渣10%混合使用，栽植盆底层施少许细饼肥。

二、浇水：期要消耗大量的水分和体内营养，水分供应要充足，要做到旱干浇透、湿排。浇水因季节而异，春季一般少雨多风，月季苗入土后先生根后发芽，根部生长的生理活动需要充足的氧气和适量的水分，发芽生长则需要充足的水分和适量的氧气，因此，月季苗下地后要浇足水，浇后松土，以后要掌握土壤的干湿、苗木的大小及雨水的多寡浇水；夏季高温时，烈日暴晒，土壤温度太高，水的蒸发量加大，植物处于虚弱半休眠状态，忌干燥脱水，浇水应在下午5点钟以后（土壤骤然降温影响苗木生长）；秋季降雨量大，注意排水。冬天休眠期一定要少浇水，保持半湿即可，露天栽培越冬，在冬眠初合理修剪追肥后，古桩月季品种，水浇足即可，始终注意保持良好的排水、通风、保水、保肥性能。浇水时不要将水溅在叶上，防止病害。

烟威地域土壤酸化比较严重，PH值做到极强碱的种植园数不胜数，如果不调养树状月季土壤层，桃树不容易发新根、孔状根弱、牙根机构非常容易萎缩。“大根是腿，小根是嘴”，没有“嘴”撒再多钙肥都没有用，消化吸收不上。

树状月季需钙量大，因此二遍“波美度”或“复元”不可或缺。规定春天一遍、7、8月份一遍，每株树4-5斤，撒后划锄，既调酸又补钙补锌。

信阳古桩月季品种「在线咨询」由南阳市卧龙区山林月季种植合作社提供。“花卉,月季树批发,树状月季,苗木种植及销售”选择南阳市卧龙区山林月季种植合作社，公司位于：南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组，多年来，山林月季坚持为客户提供好的服务，联系人：李长华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山林月季期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事盆景月季，南阳盆景月季，河南盆景月季的厂家，欢迎来电咨询。