

# 高杆大花月季树种植 高杆大花月季树 南阳春诚月季基地直销

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高杆大花月季树种植 高杆大花月季树<br>南阳春诚月季基地直销 |
| 公司名称 | 方城县春诚月季种植基地                     |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 南阳市方城县博望镇                       |
| 联系电话 | 18736666576 18736666576         |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方城县春诚月季种植基地

扦插月季花多用于多花蔷薇和小姐妹月季。按材料可分老枝和嫩枝扦插，按季节可分梅雨季节和秋季扦插，露地和盆内均可进行。选好土和扦条，在适宜季节，并做好遮荫养护等工作，以提高扦插成活率。露地扦插用土：用疏松菜园土七份加砗糠灰三份拌和制成培养土。嫩枝扦插一般在5月中旬至6月上旬多雨季节进行。选用当年

生长健壮充实，叶腋新芽尚未放叶枝条作扦条。如用开花枝，则用刚开过花后剪取中下部枝条，带三个芽。每段长约14厘米，从下面节下约2毫米处平口剪断，除去下部叶子，上部仅留一对小叶片，高杆大花月季树供应，插入土中深度是扦条长度的二分之一或三分之一，随剪随插。扦插后要浇足水，并搭设矮棚遮荫。一周内全部遮荫，使其不见光，每日用细孔喷壶喷水二至三次，保持扦条的湿润，但土壤不宜过湿，以免造成扦条腐烂。

发病季节要仔细观察，高杆大花月季树基地，一发现有感病病枝，应立即剪除并烧毁。发现病情，立即喷洒杀菌剂，每2周1次稀释喷洒25%粉锈灵可湿性1500倍液、800倍的代森该或代森锌;也可用托布津500-1000倍稀释液。休眠期清除园地，并喷洒波美3-5度石灰合剂或托布津500-800倍稀释液。月季在气温5°C以上时，芽就开始萌动生长。导致病的病原真菌在5°C以上开始活动。因此，在月季刚发芽还没有发生明显的病症状时，每周喷1次稀释800-1000倍的托布津或50%代森锌液，连喷3次，预防效果很好。在通风透光不好的环境里，病易发生，因此在管理上应注意常修剪使植株通风透光。合理施肥，适当多施磷、钾肥，增强抗病能力，加施硼、硅和锰等微量元素有防病作用。如果在家庭阳台上培养少量月季时，应该尽量选择抗病力强的月季品种。

花的香气 玫瑰花的香气要比月季浓郁很多。玫瑰的叶由5-9枚小叶组成，表面，无光泽，叶脉凹陷而皱缩，背面稍有及柔毛。月季的叶由3-7枚小叶组成，两面都，平展光滑，无皱缩，有光泽。玫瑰茎刺多，密生如针状的细硬刺(直刺)，高杆大花月季树种植，是手取不下来的;月季茎上刺少，有很大的钩刺，而且可以掰下。玫瑰的果实扁球形，而月季的果实为圆球形或梨形。

高杆大花月季树种植-高杆大花月季树-南阳春诚月季基地直销由方城县春诚月季种植基地提供。方城县春诚月季种植基地坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。春诚月季——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市方城县博望镇，联系人：雷经理。同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。