

批发基地琯溪蜜柚子苗、单独包装

产品名称	批发基地琯溪蜜柚子苗、单独包装
公司名称	简阳市石桥镇沱江苗木种植场
价格	4.00/棵
规格参数	产地/厂家:简阳市石桥镇沱江苗木种植场 品种:琯溪蜜柚子苗 高度:0.3 (m)
公司地址	中国 四川 资阳市 简阳沱江
联系电话	86 028 27270184 13320846188

产品详情

产地/厂家	简阳市石桥镇沱江苗木种植场	品种	琯溪蜜柚子苗
高度	0.3 (m)	地径	0.3 (cm)
蓬径	- (m)	树苗成活率	98 (%)
树苗年限	2	结果年限	3-4
新奇创意项目	报名		

琯溪蜜柚简易栽培管理技术

一、因地制宜

该品种适应性广，对土壤要求不严，平原、丘陵、沙地、黄土、红土、房前屋后均可种植。对土质差的地可（7×5尺）种植；土肥沃地按（8×6尺）种植。行间以南北为好。种前挖好深宽60厘米的定植穴，在穴里填放各种桔杆、栏肥、堆肥等有机肥，踏实盖土特种。

苗木要求品种纯，粗壮，根系发达，无病苗为好。一般在秋、春季植最佳。

二、肥水管理

1、小苗定植后要保持土的相应湿度。当芽长到3—4寸长时，适当配施氮、磷肥。开春雨水少，每隔15—20天施一次淡水粪，连施3—5次，做到薄施勤施，雨水多时才少施。

2、结果树一般年施两次肥：还阳肥、壮果肥。

对连年结果好的弱树，下果后需施还阳肥，占全年的60%，生长中等以上的不施还阳肥，以免树势过旺造成少花或无花。开春后气温高，土壤干可施一次萌芽肥，需要淡水粪饱灌，增加湿度，提高坐果率

。 壮果肥在第二次生理落果后进行，占全年30—40%，以有机肥为主，适当配搭磷钾肥，少量氮肥，以免影响果质（第二次生理落果前严禁施肥）。

三、整型修剪：

1、整型是关系到树架好坏和产量高低的关键。小苗定植后，应从干高40厘米处定干。从剪口下长的新梢中选留3个生长健旺方向适宜，夹角较大的新梢作为主枝，并抹去其余的芽。当芽长到40厘米摘心，上部再留二个侧芽，当侧芽长到40厘米同样摘心，这样留芽反复摘心，以后采取多拉枝少摘心，并保留副梢枝，因为这些枝是丰产结果枝。

对成年长势旺的树，要多拉旺枝，轻剪，对内膛的徒长枝、交叉枝、病虫枝应疏除，要保持内膛通风透光（弱枝不能剪），柚是中、弱枝有花，过旺枝无花，所以压旺枝保弱枝结果。

对树龄期长和历年结果衰老树要重剪。回缩、更新、复壮，在冬、夏季剪去过弱枝，回缩1/2或1/3老枝，排除过多过弱花枝，达到复壮为来年高产稳产打好基础。

四、促花、保果疏果

1、促花：柚是生长较旺的一种果树，初投产树自身产花力不强，头年注意采取办法促出足够的花来，具体用环割伤根、拉枝，打多效唑，2,4—d等措施，使树体衰弱形成花来（注意掌握好各个环节时间），为第二年产量打好基础。

2、保果。此柚自然座果率高，当花芽长出后，摘去过多的花，芽长到1寸左右抹去直立过旺的芽。第二次生理落果后疏除多余部分果。

五、主要病虫害防治

主要有炭疽病、疮痂病、红蜘蛛、食心虫等，对果园冬天要清园，以石硫合剂加杀虫药；开春在开花前打一次杀菌杀虫药，以后发生病虫害及时防治