

# 山西运城绛县批发钙果苗、苗木、果树、规格齐全

产品名称	山西运城绛县批发钙果苗、苗木、果树、规格齐全
公司名称	绛县古绛镇泽润苗木经销部
价格	2.00/棵
规格参数	产地/厂家:石桥镇沱江苗木种植场 品种:皮球桃 高度:0.5 (m)
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇白家涧村118号
联系电话	13466942660

## 产品详情

产地/厂家	石桥镇沱江苗木种植场	品种	皮球桃
高度	0.5 (m)	地径	0.5 (cm)
蓬径	- (m)	树苗成活率	99 (%)
树苗年限	2	结果年限	3-4

### 树栽培管理技术简要

皮球桃又名60-4-1，该品种7月上旬成熟，平均单果重200克，最大果重400克，果实扁圆形，全面作深红色，风味酸甜适度，果肉白色，质硬，耐贮运，易管理，极丰产。定植第三年亩产1吨以上，第四年进入盛果期，亩产一般在4000-6000斤左右，适合结农村产业结构调整，规模化种植作配套品种。

#### 一、桃树的生物学特性

- 1、桃树是强喜光、耐旱、怕涝树种。温度低于4℃时根系停止活动，最适宜根系生长土温为12—18℃，果实膨大期气温为25℃左右为佳，成熟期以28—30℃为好。昼夜温差大、湿度低，果实品质最好。
- 2、桃树根系集中分布在20厘米至40厘米处，浅根性，土温低于10℃逐渐进入休眠状态。
- 3、桃树耐涝能力差，水分过大，会出现叶片黄化，淹水1—3天即可能发生落叶，甚至死亡。

#### 二、桃树的栽培要点

- 1、选址。因桃树为喜光树种，故选择通风向阳，排水良好的地方。以沙壤中性土质为佳。
- 2、定植。定植时期以秋栽春栽为宜，栽植规格常见的有3×4、2×4、1.5×3、4×4，管理条件好的也有

密植为1×2、2×2的，应依据管理条件、气候条件、土壤肥力等确定。定植方法：挖好直径50cm，深60cm的穴，先在底层铺10cm碎秸杆，用表土压盖20cm，上面再放腐熟的鸡粪、猪粪等有机杂肥约20cm，再用表土盖压，灌透水，使土壤沉实备栽。定穴栽植：每穴内施过磷酸钙200克（4两），与土混匀，有利于新根发良。栽植时根系要舒展，苗木要直立，做到“一提二踩三封土”，即苗木放好后封土，向上轻提使根系舒展，再封土、踩实、灌透水后把苗木扶直封土，再踏实。最后覆上地膜。

### 三、整形修剪

- 1、定干：桃树主干30厘米—40厘米，定植密度大的定干可以适当低一些，密度小的定干可以高一些。
- 2、整形：定干后一般选择树形为自然开心形。即在主干上选择3—4个不同方向的侧芽做主枝培养，主枝在50cm时摘心，促发二次枝。主枝和二次枝均采用拉枝的方法拉成盘状，即成自然开心形树形。
- 3、修剪：第一年冬剪时二次枝在长约50cm处选饱满芽短截，留4—5个芽重短截促发旺枝，其余轻剪使其结果。

### 四、肥水管理

定植后第一年主要是加强肥水管理，壮大树势。在桃树萌芽后主要以清水粪施肥，每15天一次，连续施3次，后期每挑清水粪加尿素100克（2两）、磷肥200克（4两）施肥，每15天一次，连续施3个月，促壮树梢，为第二年开花试果做准备。

氮磷肥应在花前和硬核期施用，根部灌注，果实膨大期追施氮肥、钾肥，有利于长个和改进果实品质，每次施肥后都要灌透水。

在土壤结构不良，还要注意其他元素的施用，可以通过施叶面肥进行补充。

#### 叶面喷肥主要种类及用量

肥料名称使用时期使用浓度（%）硼砂芽鳞片开裂后花前1—2、花期0.1—0.2尿素生长前、中期0.3硫酸亚铁铵有缺铁黄化迹象时0.2—0.5硫酸二氢钾硬核前，果实第二次膨大期0.3—0.5硫酸锌芽鳞片开裂后0.1—0.3氯化锰缺锰叶肉退绿时0.2—0.3

### 五、病虫害防治

病名主要性状防治药物桃细菌性穿孔病桃叶出现黄白或白色小圆点，后小圆点干枯脱落，形成穿孔。芽膨大前期喷5度（波美度），石硫合剂，展叶至发病前喷布65%代森锰锌可湿性粉剂500倍液。桃树根癌病根部出现乳白色或微红色瘤状物，表面组织易破裂、腐烂，有腥臭味。用快刀彻底切除癌瘤，用稀释100倍的硫酸铜溶液消毒切口，再外涂波尔多液保护。桃疮痂病

（黑星病）主要为害果实，也可危害枝叶，果实出现暗绿色病斑后形成龟裂，叶片出现灰绿或暗绿色病斑，最后变为褐色或紫红色病斑，脱落形成穿孔。喷3—5度石硫合剂液，每15天喷65%代森锰锌500倍液，50%多菌灵可湿性粉剂800倍液，50%甲基托布津500倍液，交替使用。桃炭疽病主要危害果实、叶片、果面形成橘红色小粒点，形成早期落果，病叶上卷，病斑淡褐色或深褐色，边缘清晰，枝梢枯死。喷3—5度石硫合剂液，每15天喷65%代森锰锌500倍液，50%多菌灵可湿性粉剂800倍液，50%甲基托布津500倍液，交替使用。桃白粉病叶片产生淡黄色小斑，果实产生圆形斑点，均被覆密集白色粉状物。喷50%硫悬浮500倍液，50%多菌灵可湿性粉剂，20%粉锈灵乳油1000倍液，50%甲基托布津溶液。桃银叶病病叶铅色，后变银白色，异于正常叶，枝干心材浅褐色，组织干燥，有酒糟味。销毁病叶剪去病枝，甲基托布津涂抹剪口，避免病菌着生。桃溃疡病树皮出现病斑，树皮隆起，皮层组织红褐色，有胶体出现，有酒糟味。用刀片彻底刮除病组织，加涂上腐必清或菌毒清，再用薄膜包裹。桃流胶病枝干溢出半透明胶质，雨后加重，皮层坏死，最终导致枝干枯死。落叶后枝干大枝，石灰涂白。芽膨大前期喷5度石硫合剂加80%5氯

酚钠200—300倍液，铲除越冬病菌。桃蚜40%氧化乐果乳剂1500倍液，50%甲胺磷2000倍液。红蜘蛛20%三氯杀螨醇1000倍液，扫螨净水胺硫磷。潜叶蛾50%杀螟松乳剂1000倍液，50%对硫磷乳油1500倍液。桃小绿叶蝉40%氧化乐果乳剂2000倍液，25%速灭威可湿性粉剂600—800倍液。桃红颈天牛磷化铝、敌敌畏塞孔熏杀。桑白蚧桃树发芽前喷5度石硫合剂预防，80%敌敌畏乳剂800倍液。