

批发基地 柠檬苗、柠檬

产品名称	批发基地 柠檬苗、柠檬
公司名称	简阳市石桥镇沱江苗木种植场
价格	1.00/棵
规格参数	产地/厂家:石桥镇沱江苗木种植场 品种:柠檬 高度:0.5 (m)
公司地址	中国 四川 资阳市 简阳沱江
联系电话	86 028 27270184 13320846188

产品详情

产地/厂家	石桥镇沱江苗木种植场	品种	柠檬
高度	0.5 (m)	地径	0.3 (cm)
蓬径	- (m)	树苗成活率	96 (%)
树苗年限	1	结果年限	3-4

柠檬一、建园 柠檬全身都是宝，种植土快要选好；土层深厚水源足，不怕旱涝保丰收。

新植柠檬春夏秋，浇栽高垒水浇透；清水保湿不用肥，合理密植长势优。二、整形 要想柠檬产量高，修枝整形很重要；弱枝结果不能剪，树形要靠撑拉吊。

扭枝段剪和断根，控制营养莫旺长；春梢秋梢要留住，夏梢抹去树儿壮。三、施肥 柠檬树儿长势旺，肥水必需要跟上；幼树一年施6次，氮肥重来磷钾轻。

成年果树施3次，主要施在夏秋春；磷钾重来氮肥轻，每株粪水上百斤。四、防病 流胶病，烂树桩，氮多日灼和创伤；刮出病皮再纵刻，涂上波尔多液浆。

疮痂病，害人精；害得柠檬长钉钉。春梢花谢要防治，生药用大禾果利，福星乳油和世高；还有甲基托布津。炭疽病，危害长；早春盛夏害嫩梢。

果实感病品质降；成树五至七月防。大生仙生波液；喷布树冠套袋防。五、治虫 红黄蜘蛛太猖狂；嫩枝叶果都遭殃。花前防治是重点；四五九十及时防。

石硫合剂喷树冠；冬季可用尼索朗。达螨灵，维多力；除掉害虫果实壮。潜叶蛾，鬼画符；嫩叶上面画地图。高温多湿危害重；避免危害夏梢除。

秋梢抽发及时防；维多力，杀虫双；齐墩螨素、大功臣；杀虫还有莫比朗。蚱虫类，家族大；叶片、果实都害怕。田间发生双高峰；出在五月六月中。

机油乳剂、艾美乐；冬季清园难越冬。乐斯本，莫比朗；松脂合剂也能防。锈壁虱，逗人恨；受害果实小又硬。两次用药不一样；六月底前尼索朗。

七月以后药改药；石硫合剂才恰当。六、采果

要想柠檬卖相好；“两剪”采摘莫创伤。晴天、露干分期采；轻采轻摘又轻放。洗浸凉干再套袋；耐储耐运价格高。柠檬喜欢酸性土壤，因此养柠檬必须经常浇硫酸亚铁水（北方），喜光照，管理比较粗放，冬季0度左右搬到屋子里，和橘子的养法差不多！柠檬为芸香科柑橘属常绿小乔木。叶片较小，长椭圆形，叶缘具细锯齿。花单生，一年四季开放，香气浓郁。果实长椭圆形或卵形，秋冬成熟。果皮为黄色

，果肉极酸而浓香，果汁为柠檬酸，果皮可提炼柠檬油。柠檬盆栽技术主要有以下几点：育苗与上盆南方栽培量大，宜用嫁接繁殖；北方栽培量少，主要用扦插方法，也可购买嫁接苗栽培。柠檬的根系对水分、养分与土壤要求较高，盆栽用土应配制成透水透气、保水保肥、微酸性培养土。上盆与换盆时间，秋后、早春均可，可按当地气候灵活掌握。光照与温度柠檬为喜光植物，然而阳光过分强烈，则生长发育不良。一般中午需将植株换放适宜生长的年平均温度在15℃以上，最佳生长温度为23℃至29℃，超过35℃停止生长，-2℃即受冻害。柠檬夏季一般不需降温，在霜降前入室，清明后出室，可安全越冬。浇水与施肥柠檬在生长发育中需要较多的水分，但水分过多又不易烂根。一般而言，春季是抽梢展叶、孕蕾开花的时期，要适量浇水。夏季光照强，温度高，需要的水分较多。但要适时适量，否则会引起落果。秋季是秋梢生长、果实迅速膨大期，必须要有充足的水分。晚秋与冬季是花芽分化期，盆土则要偏干。柠檬较喜肥，除上盆、换盆施足基肥外，生长期应坚持薄肥勤施的原则。施肥次数与施肥量，须按长势、物候期而定。如施液肥以充分发酵的饼肥水为好，饼水比为1：200。北方土质偏碱，可在肥液中加入硫酸亚铁，配成微酸性营养液。修剪修剪一般分为冬剪与夏剪。冬剪应本着“删密留疏，去弱留强”的原则，剪去枯枝、短截弱枝和无初空作用的徒长枝。夏剪在无结果树上主要短截过长的枝梢，在结果树上抹去夏梢，短截树冠外围中上部的衰退枝条。促花与保果柠檬本是四季开花结果的树种，而北方盆栽则多是春季开花结果。因此在秋梢停止生长后，须控水。待叶片两侧开始内卷，再适度浇水，以促进花芽分化。注意盆内施肥，叶面喷肥，培育健壮的结果母枝。保果的主要措施，一是加强有肥水供应，积累养分；二是进行人工授粉；三是疏花疏果。柠檬果实大，需要养分多，正常叶果比30至40：1。按照去弱留强，分布均匀的原则，先是疏去过多过密的花蕾；再在幼果1厘米大小时，疏去部分果实；最后在生理落果后，按照叶果比定果。也可弱枝不留，壮枝只留1个果