

# 兔用特效治疗药系列 显华

产品名称	兔用特效治疗药系列 显华
公司名称	四川显华动物药业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:显华 功能:子宫内膜炎，阴道炎，乳房炎等 对象:兽药
公司地址	遂宁经济技术开发区金梅路13号
联系电话	13909060781 13882589395

## 产品详情

品牌	显华	功能	子宫内膜炎，阴道炎，乳房炎等
对象	兽药	规格	10ml*10去/盒
剂型	注射剂	使用方式	注射用
适应症	子宫内膜炎，阴道炎等		

### 兔常见疾病以及防治方法

#### 细菌及病毒性类

##### 1.兔病毒性出血症（兔瘟）

该病又叫兔出血性肺炎或兔病毒性败血症，是由病毒引起的急性败血性传染病。最急性型，兔在吃食时，突然尖叫，倒地抽搐，很快死亡；急性型，体温升高至41~42℃，不食、精神沉郁，呼吸140次/分，患兔数小时至2日内死亡；温和型，常发生在3个月龄之内的幼兔，有体温升高和神经症状，部分病兔可以恢复。

(1)预防病毒性出血症组织灭能疫苗，仔兔断奶后接种1次，成年兔每年进行2次接种，每只皮下或肌肉注射1~2毫升。病毒性出血症和a型魏氏梭菌二联灭能疫苗，断奶仔猪皮下注射2毫升，成年兔每年2次皮下注射，每次2毫升。

##### (2)治疗

板蓝根注射液加维生素c注射液，肌肉注射。还可以控制继发感染用磺胺嘧啶或者氟苯尼考注射

聚肌胞注射液1毫克、维生素c注射液500毫克，醋酸可的松注射液50毫克，肌肉注射。同时板蓝根冲剂水冲后，自由饮用。

## 2.巴氏杆菌病

本病是由多杀性巴氏杆菌，引起兔急性败血症、传染性鼻炎、地方性肺炎、中耳炎、结膜炎、阴道炎及脓肿等。

(1)预防兔巴氏杆菌氢氧化铝甲醛苗，皮下注射1毫升，免疫期4~6个月。兔巴氏杆菌和魏氏梭菌二联苗，未断奶兔皮下注射1毫升，其余兔2毫升，4~6个月，进行第二次注射。

### (2)治疗

青霉素加链霉素，肌肉注射，每日2次，连用2~3天。

环丙沙星注射液，肌肉注射，每日1次，连用3天。

磺胺嘧啶注射液加恩诺沙星注射液，肌肉注射，每日2次，连用3天。

对患鼻炎的兔，用氯霉素注射液滴鼻，每个鼻孔5滴，每日3次。对重病者，还要按每公斤体重20毫克，肌肉注射，每日2次，连用5天。

## 3.魏氏梭菌病

本病是由a型魏氏梭菌，引起兔急性水样腹泻性传染病，患病兔致死率很高

(1)预防兔a型魏氏梭菌氢氧化铝灭能菌苗，每只皮下注射2毫升，21天产生免疫力，免疫期达6个月。兔病毒性出血症和a型魏氏梭菌二联灭能苗，断奶仔兔，皮下注射2毫升，成年兔每年2次皮下注射，每次2毫升。

(2)治疗：青霉素5万单位，链霉素50毫克，一次内服。恩诺沙星注射液，肌肉注射，每日2次，连用2天。痢菌净注射液，皮下注射，每日2次，对患病早期兔有治疗效果，对尚未发病兔有防止发病的作用。

4.传染性水泡性口炎本病是由病毒引起，1~3月龄仔兔的口腔粘膜发生水泡，破溃后糜烂、溃疡，大量唾液从口角流出，致死率达50%。

(1)预防本病尚无疫苗，要坚持自繁自养的原则，调剂品种时，引进的种兔，要隔离观察1个月以上，健康无病，才可入群。坚持常规消毒。发现病兔，必须立即隔离，进行处置。

(2)治疗2%明矾液冲洗口腔，每日2次，连用3天，冲洗之后涂碘甘油(碘酊甘油等量混合)。2%硼酸液冲洗口腔，再用明矾7份、白糖3份混匀后0.5~1克涂抹口腔，每日2次，连续3~5天。青黛散。青黛10克、黄连10克、黄芩10克、儿茶6克、冰片6克、桔梗6克、明矾3克，共研细末，每次0.5~1克，撒布患处，每日3次，连用2~3天。氟苯尼考注射液或者庆大霉素注射液

## 5.大肠杆菌病

本病是由一些致病性大肠杆菌，引起仔兔和幼兔的肠道传染病，患兔急性腹泻，水样或胶冻样粪便，严重脱水，消瘦，1~2日内死亡，死亡率极高。

(1)预防兔笼、兔舍、用具定期严格消毒。不喂霉烂变质的饲料，青绿饲料洗净之后再喂。发现病兔，应立即隔离观察治疗，并进行大消毒。

(2)治疗氟哌酸注射液，肌肉注射，每日2次，连用2~3天。

环丙沙星注射液，肌肉注射，每日1次，连用2天。

庆大霉素注射液，内服，每日2次，连用2天。

氟苯尼考，加水适量内服，每日1次，连用2天。

磺胺嘧啶注射液1毫升，肌肉注射，每日2次，连用2天。

## 6.沙门氏杆菌病

本病是由沙门氏杆菌引起中兔和幼兔急性腹泻，体温升高，迅速死亡。慢性出现顽固性下痢。患病母兔发生流产。

(1)预防坚持自繁自养原则，调剂品种时，引进的种兔一定要隔离观察1个月以上，无病才能入群。改善饲养管理，增强抗病能力。坚持经常性的消毒。

### (2)治疗

磺胺五甲嘧啶注射液，每日1次，连用3天。

氟哌酸注射液，肌肉注射，每日2次，连用2~3天。

氯霉素和酵母片各1片，内服，每日2次，连用4天。

乙酰甲奎每公斤体重10毫克，内服，每日2次，连用3天。

## 7、波氏杆菌病

本病的潜伏期7~10d。成年兔表现鼻炎和支气管炎。有多量的浆液性、黏液性鼻液流出。鼻炎长期不愈，鼻腔流出黏液性或脓性分泌物，打喷嚏，呼吸困难，不食，消瘦等。仔兔多呈急性经过，初期刚见鼻炎病状后，即表现呼吸困难，迅速死亡，病程2~3d。

### 防治

磺胺二甲嘧啶注射液 氟苯尼考注射液 土霉素注射液

## 8、兔粘液瘤病：

本病潜伏期2~8天。急性病例呈现耳聋，体温升高42℃，眼睑水肿，2天内死亡。大多数病例发病后5~7天眼睑水肿、下垂，肛门、生殖器及口、鼻周围发炎、水肿。由于皮下组织的粘液性水肿，头部呈狮子头形状。耳朵也剧烈肿胀而下垂。后期出现皮肤出血，发生鼻炎和肺炎。流行后期一般良性经过，只在体表发生分散孤立的粘液瘤结节，萎缩破溃，被痂皮覆盖。防治 板蓝根注射+黄芪多糖注射 配合氟苯尼考注射液或用板蓝根注射液 +vc注射液 配合 庆大霉素注射液9、密螺旋体病(兔梅毒)

本病潜伏期5~30天，长的可达3个月。病初可见外生殖器和肛门周围发红、水肿、形成粟粒大的小结节，随后流出粘液性、脓性分泌物，结成棕色的痂，剥去痂皮，可露出溃疡面，创面湿润，稍凹下，边缘不整，易出血，周围组织水肿。腹股沟、胴淋巴结肿胀。防治痢菌净注射液 林可霉素注射液+庆大霉素注射液

## 10、兔链球菌病

本病是春秋多发，主要危害幼兔。病兔体温升高，不吃，精神沉郁，呼吸困难，间歇性下痢和死亡为特征。

## 防治

青霉素每，每天2~3次肌肉注射，连用3~4天。

氨苄青霉素，每天2次肌肉注射。

磺胺嘧啶钠内服或肌肉注射，每天2次，连用4天

## 11、毛癣病

本病是由真菌毛癣霉与小孢霉感染皮肤表面及毛囊和毛干引起的一种传染性皮肤病。以兔的皮肤呈不规则的块状或圆形脱毛、断毛及皮肤炎症为特征。健康兔与病兔直接接触传播或通过污染的用具传播。幼龄兔易感。兔开始多发生在头部、嘴周围及耳朵，继而出现在肢端和腹下。患部以环形、突起、带灰色或黄色痂为特征，3周左右痂皮脱落，呈现小的溃疡，造成毛根和毛囊的破坏。如并发细菌感染，引起毛囊脓肿。有时皮肤出现环形秃毛斑，以及皮肤炎症等变化

## 防治

制霉菌素 内服

脱毛的地方可用甘油或者碘酒涂抹

## 寄生虫类病

### 1.兔螨病

兔螨病是由兔痒螨、疥螨和寄食姬螨，分别寄生于耳部、全身皮肤和肩胛部而引起的外寄生虫病。病兔剧痒，摩擦、爪抓、嘴啃，皮肤发炎，结痂，脱毛，龟裂。

(1)预防兔舍要保持干燥、透光、通风、清洁，兔舍、兔笼、用具坚持消毒制度，用5%克辽林、10%~20%生石灰水消毒。发现病兔立即隔离治疗，防止传染。

### (2)治疗

2%敌百虫水溶液，喷洒患处，7天后再喷洒1次。

阿维菌素，皮下注射。口服剂，每公斤体重0.1克，灌服，7天后再服1次。

2%碘酊3毫升，滴入病兔外耳道，再用2%敌百虫软膏(凡士林98克、敌百虫2克混匀)3克，涂抹外耳道。

速灭杀丁乳油，按1000倍稀释，涂擦患处。

双甲脒配制成0.4%溶液，喷洒患处，7天后再喷洒1次。

毒蝇磷乳油，涂擦患处，4天后再涂擦1次。

### 2.兔虱病

本病是由兔虱寄生于体表引起的外寄生虫病。患兔发生痒感，爪抓、啃咬、搔擦，皮肤呈现小出血点，皮肤增厚，皮屑增多，消瘦，生长停滞。

(1)预防兔舍要清洁、干燥，阳光充足，定期消毒。

(2)治疗

敌百虫溶液喷洒患部，7天后再喷洒1次。

阿维菌素，皮下注射。口服剂，每公斤体重0.1克，灌服，7天后再服1次。

#### 4.球虫病

本病是由兔球虫感染120日龄以内的幼兔，表现臃气，下痢，肝肿大，消瘦，贫血等多发生在温暖多雨时期，特别是霉雨季节最易感染，呈地方性流行，死亡率很高。

(1)预防兔舍保持清洁、干燥、通风，每天打扫粪便，将粪便堆积发酵，生物热处理后，再做肥料，坚持常规消毒。

复方磺胺甲基异口恶唑，每公斤饲料添加200毫克，服5天，停药3天，为一个疗程，共3个疗程。

氯苯胍每公斤饲料添加150毫克，断奶后的兔连喂45天。

(2)治疗

磺胺二甲嘧啶钠注射液，每日1次，连服5天。

复方磺胺甲基异口恶唑注射

黄连6克、黄柏6克、大黄5克、黄芩15克、甘草8克，混合研末，每只兔每次2克，内服，每日2次，连服5天。

氯苯胍每公斤体重10~15毫克，内服，每日1次，连服10天。

#### 兔脑炎原虫病

病一般为慢性或隐性感染，常无症状，有时见脑炎和肾炎症状，如惊厥、颤抖、斜颈、麻痹、昏迷、平衡失调及腹泻、蛋白尿等。

防治

目前并无有效方法和试用强力霉素磺胺嘧啶治疗

#### (三)普通病

##### 1.臃胀

定不时，精粗饲兔多吃了易发酵、易膨胀饲料，霉败、变质的饲料，含露水的豆科饲料等，都可引起臃胀。患兔食欲废绝，腹部膨大，呼吸困难，心跳加快。

(1)预防喂料定量、料合理搭配，不喂霉败、变质的饲料。

## (2)治疗

健胃消食散 内服。

硫酸镁 内服。

大黄苏打片，内服。

## 2.便秘

本病由于饲养管理不当，精、粗饲料比例不合理，缺乏青绿饲料，饮水不足，缺乏运动等原因引起。患兔食欲废绝，粪球细小，干燥坚硬，几天不排粪，精神不安，回顾腹部，嘴啃肛门等。

治疗：

硫酸镁 内服。

大黄苏打片，内服。

植物油 内服

氯化甲酰甲胆碱 注射

## 3.腹泻

兔吃了霉败、腐烂、变质的饲料，饲喂不定时定量，贪食过多，饲料突然改变，饮水不清洁，吃了化学药品、农药等，圈舍潮湿，阴雨天气等都可发生腹泻。

(1)土霉素0.2克，内服，每日2次，连服2天。

(2)大蒜2~4克，捣碎，内服，每日2次，连服2天。

(3)痢菌净，每公斤体重8毫克，内服。注射剂，每公斤体重4毫克，肌肉注射，每日2次，连用2~3天。

(4)氟哌酸注射液，肌肉注射，每日2次，连用2天。口服剂每公斤体重30毫克，内服，每日2次，连服2天。

(5)杀痢王透皮剂，0.5~1毫升，涂擦背部或腹部皮肤，重症隔日再涂擦1次。

## 4.感冒

感冒多发生于秋末至早春时期，气候突变，贼风侵袭，遭受雨淋等。患兔流鼻涕，打喷嚏，咳嗽，不吃，体温有的40℃以上，呼吸困难。

(1)预防在气候突变时防止兔受风寒，防贼风侵袭，防雨淋。

## (2)治疗

柴胡注射液加青霉素 肌肉注射，每日1次，连用2天。

安痛定注射液加维生素c注射液，肌肉注射，每日2次，连用2天。

复方氨基比林注射液加青霉素加链霉素，肌肉注射，每日2次，连用2天。

## 6.乳房炎

新生乳兔吮乳时咬破母兔的乳头，兔笼、箱的铁丝、铁钉及锐利物损伤乳房，而感染细菌。另一种是内源性的，没有损伤，细菌通过循环系统而来。

(1)预防清除兔笼、兔箱内的尖锐物，防止损伤乳房。每天细致观察母兔，要早发现、早治疗。产前3天，适当减少精料。

### (2)治疗

患乳房炎初期，把乳汁挤出，用毛巾或布沾冷水，在局部冷敷，并涂擦10%鱼石脂软膏。

普鲁卡因青霉素，局部分4~6个点，皮下注射。

青霉素加链霉素肌肉注射，每日2次，连用2~3天，体温升高者，安痛定1毫升或安乃近1毫升，肌肉注射。

恩诺沙星注射液，肌肉注射，每日1次，连用2~3天。