

## 内江提供大种肉鸡出壳苗脱温苗

产品名称	内江提供大种肉鸡出壳苗脱温苗
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

## 产品详情

广汉中力家禽养殖有限公司是一家以育种、孵化、销售为一体的公司。有多年的养殖技术经验，常年为各位新老客户提供技术服务，指导养殖户掌握基础知识，提高养殖水平。养殖的新手很多没有养殖经验，本公司可以给大家提供养殖技术，防疫事项，全程的技术跟踪指导，保障养殖成活率！

开食时要注意下列问题：1. 适时开食 开食时要注意时间，不能过早或晚，要求适时开食。通常雏鸡出壳后初次吃料，多在孵出后12-24小时内或当有1/2-1/3雏鸡有啄食行为开食为宜，迟不超过36小时。过晚开食会使雏鸡失水、体弱、影响正常的成长发育。2. 挑出体弱雏鸡 雏鸡运到育雏舍，经休息后，进行清点将体质软弱的雏鸡挑出，因为雏鸡数量多，个体小，体质差、不会吃料的雏鸡另群饲养，以便加强饲养，使每只雏鸡均能开食和饮水，促其生长。3. 延长照明时间 开食时为了有助于雏鸡觅食和饮水，出壳后3天内采取昼夜24小时光照，其光照强度为每0.37平方1瓦光源。4. 选择开食饲料 开食饲料，一般要求营养丰富，适合性佳，容易消化吸收，可以选择碎米、碎玉米等饲料。大型鸡场或工厂化养鸡场，开食料一般采用粉料或碎料。5. 开食不可过饱 开食时要求雏鸡找到采食的食槽和饮水器，会吃料能饮水，但不能过饱，尤其是经过长时间运输的雏鸡，此时又饥又渴，如任其暴食暴饮，会造成，严重时致大批折损。6. 不能使雏鸡湿身 注意盛水器的规模，大小适宜，以免雏鸡进入水盆，而致湿身造成挤压取暖窒息折损。温馨提示：春季是万物复苏，各种\*\*大量繁殖，为家禽带来很大危害，特别是大肠杆菌病，不仅折损率高，还经常发生，难以\*\*。如果出现大肠杆菌病尽量快速\*\*，不然对鸡群伤害更大。 赠养殖资料，全程技术服务，成就品质，实力打造品牌，广汉家禽养殖与您携手共赢！本场出售脱温苗30天以上，成活率高，疫苗齐全，无需保温。