

树莓丰产栽培管理技术 树莓

产品名称	树莓丰产栽培管理技术 树莓
公司名称	白山市八道江区源裕农艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:树莓
公司地址	中国 吉林 白山市 建设街105号
联系电话	86-0439-3235935

产品详情

品种 树莓

一、前期准备：每亩施3~5立方米腐熟的厩肥或农家肥,撒匀深翻、耙平、起垄。垄宽50cm~70cm,高20cm~30cm,垄间距一般2m~2.5m。起垄沟耙平。尤其要注意沟渠排水顺畅,防止渍水烂根。最好采取灭菌措施：用适量的多菌灵(或甲基托布津)掺入厩肥内混匀,撒入地内。

二、栽植时间：树莓春栽秋栽均可,春栽在土壤解冻后苗木萌发前(3月~4月),以土壤10cm~20cm地温稳定在10℃以上为春栽的适宜时期；秋栽在苗木木质化后至土壤结冻前(10月~11月)为好。以早栽为好,苗木失水少,易于成活,来年春发芽早,生长快。掌握在土壤结冻前一个月最佳,北方秋栽苗木易“抽条”。地上部分剪留20cm左右,秋栽后埋土越冬。

三、栽植：树莓苗的栽植行株距为2.5×0.5米,每亩栽530株。栽前苗根部浸水12~24小时,以保树苗体内有充足的水分。使根系舒展栽入,深埋浅根,根茎与地表平齐,栽后轻提一下,使根系充分舒展,踩实浇透水,待水渗下后覆一层疏松表土。为缩短缓苗期,提高成活率,要勤浇、少浇水、保持土壤湿润。

四、肥水管理：第一次是在开花后至幼果形成期,以氮肥为主；第二次是果实形成后,以磷钾为主；施基肥宜在早秋,以腐熟的农家肥为主,也可加入适量有机化肥。施基肥距植株40~60cm一侧与土拌和施用。施用化肥时,土壤要有充足的水分,化肥距植株50cm一侧施用约0.3kg的即可。果期喷施叶面肥。采用林肥和微生物菌肥为主、化肥为辅的方法,有利于丰产和改良土壤、提高果品质量和甜度。为达到无公害、绿色食品标准,最好用农家肥。

树莓喜湿润,耐旱不耐涝,忌水渍。天旱浇水时,土壤湿度60%、深度达到40cm即可,以适量多次为宜。夏季浇水时间最好选择在下午4点气温下降以后。原则是旱能浇,涝能排。在北方入冬前浇一次封冻水。

五、修剪：第一次在4月下旬至5月上旬在枝条绑架后、展叶前进行。树莓春剪也称果枝修剪,包括除病株、去损伤枝。第二次在6月初基生枝全部萌发,在枝条生长到40—50厘米时进行。修剪原则是留强去弱,每丛保留6-8株生长强壮的枝条,修剪的剪口与地面越近越好。第三次是在结完果后,对结完果的枝条全部剪除。第四次是对当年基生枝短截,保留170—180厘米长度为宜。

六、病虫害防治：病害，树莓比较抗病,病害较少。一旦发生病害可喷多菌灵、速克灵等杀菌药，发生虫害可喷爱福丁、氯氰菊酯或向专家咨询请教。

七、搭架缚引：春季树莓出土上架时间不宜过早也不宜太迟,待晚霜过后10cm地温稳定在4-6℃时,即可。出土后按架面10公分一根条引缚到铁线上，把伤残枝和超长枝剪齐剪掉。树莓架的高度以1.6米至1.8米最合适。

八、埋土防寒：埋土前灌一次透水。先在基部培土,避免压断枝条,顺着一个方向,把树莓枝条压倒,要把整个植株用土埋严,避免透风,一般土层在10cm左右,严寒地区可覆土20cm。绝对低温高于 - 25℃时,可不作越冬防寒处理。（但冬季干冷风大地区也要埋土）

九、日常管理：进行常规的铲草、松土等管理，栽植第一年可套种些矮科作物或蔬菜等。