

大邑供应大白鹅出壳苗，养殖技术指导

产品名称	大邑供应大白鹅出壳苗，养殖技术指导
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

本公司长期出售各种鹅苗：朗德鹅、麻鹅、三花鹅、大白鹅、杂交白鹅等技术支持，帮忙销！让您没有后顾之忧！

****养殖适宜温度**我们都知道鹅是从鹅蛋里面孵化出来的，刚孵化出来的**抵抗力是非常弱的，因此就要对他们进行细心的呵护，尤其是温度方面要掌握好，太低太高都不利于**的健康成长。****养殖适宜温度**温度适宜时，**的体热消耗少，生长发育快，成活率才高0l—3日龄的环境温度应在31_33 。4—6日龄28~30C，7~10日龄24~26 ，11~13日龄20-22 o温度要逐渐降低，每天温度变化不超过20Co不同的气候条件下，升温或降温要以**的行为表现为准，要尽量满足**对温度要求的反应。在温度过低时，**怕冷，会靠近热源扎堆，互相取暖。易发生呼吸道病，往往造成压伤或窒息死亡，生长速度也会受到影响。温度过高时，**远离热源，张口喘气，饮水量增加，食欲降低，正常代谢受到影响，抗病力下降。温度正常时，**精神饱满，活泼，食欲良好，饮水适度，绒毛光亮，分布均匀，静卧无声，吃食、饮水、排泄正常。小鹅保温技术 雏鹅调节体温能力弱，饲养中应严格控制温度、湿度。保温期的长短因品种、气温、日龄和雏鹅的强弱而异，一般需保温23周。适宜的育雏温度是15日龄为2827 ，610日龄为2625 ，1115日龄为2422 ，1620日龄为2220 ，20日龄以后为18 。温度是否合适，可通过观察雏鹅表现来了解，当雏鹅拥挤成堆，不吃食，说明是怕冷，温度偏低，此时除增温外，还应用手拨散雏鹅，使之活动，防止被压死。如雏鹅张口呼吸，叫声高而短，饮水量增加，说明受热，温度偏高，应增加饮水，及时适当降温。当雏鹅伸腿，三五成群，静卧无声或有规律吃食饮水、排泄粪便，间隔1015分钟运动一次，是温度适宜的具体表现。 鹅舍湿度对雏鹅的健康和生长也很重要，一般要求相对湿度维持在60%65%。湿度过大，温度低，小鹅易患呼吸道疾病和腹泻；湿度过大，温度偏高，小鹅易“出汗”，食欲减少，抗病力降低。所以，雏鹅饮水时（因鹅是水禽，有戏水习性），要使雏鹅不入水槽，水不沾身，不洒水于地面上，保持鹅舍干燥。雏鹅舍内的垫草或锯末23天应更换一次。小鹅的养殖方法 一、小鹅饲养 小鹅爱吃叶菜类饲料。小鹅开食可将青菜切成细丝，拌到半生半熟的碎米饭里，一般碎米饭占20*%-30*%，青菜占70%-80%。把拌好的饲料撒在干净的草席上或者塑料薄膜上，让鹅自*由采食。出壳一星期，白天喂6-7次，夜里喂2-3次。随着小鹅的长大，喂料次数可以逐渐减少。春季天气较冷，可以在屋子里放上水盆，让小鹅自*由饮水。天暖之后可将小鹅装在竹篮子里，到河边浅水里戏水，时间不要太长，一次2-3分钟，每天2-3次。一个星期后可以在晴天中午，把小鹅赶到河里去。另外，1-2周内温度须在20 以上，垫草要勤换勤晒，保持地面清洁干燥。二、鹅群放牧 第*一次放牧，要选择没有风的晴天，给小鹅喂完食，把它们赶到附近草地上，让它们自*由活动，活动1小时后，就让鹅群回棚休息，以后慢慢延长放牧时间和距离。3个星期后，白天可以**放牧，只在晚上喂一次料，4周以后，晚

上也不用补料。一般250-300只鹅为一群，由两人管理比较合适，把鹅群赶成长方形，让它们慢慢前行，不能太快太散，要让所有的鹅都吃上草料。早晨天一亮，就可以把鹅群赶出棚，让它们吃露水草。中午赶回棚休息，下午要出去，日落回棚。如整天在田野放牧，中午要把鹅群赶到树阴下休息。如遇阴雨天，则不要放牧。

三、**防治 饲养春季鹅主要防治小鹅瘟及流行性***。防治小鹅瘟主要依靠**接种增加**。用小鹅瘟疫*苗接种成年母鹅，每只鹅在产蛋前1个月注射稀释1 100倍的小鹅瘟疫*苗1毫升，一个月后产生**，这时留的种蛋因母鹅体内含有抗体，孵出来的小鹅就可以得到免疫。 **流行性***，可将土霉素碾成粉，按万分之二拌入饲料饲喂。 **可用青霉素按每公斤体重2万单位肌肉注射。此外，用蒜泥加糖水灌服也可**和**。

刚出生的小鹅吃什么 经过雏鹅出壳后，从鸟*巢中删除时要绒毛干。年轻的鹅蛋孵化出生约36个小时吃雏鹅；成年鹅的蛋孵出小鹅出生24小时内吃。小鹅禁忌油腻物质，洗净后切碎米新鲜青绿饲料混合喂1015天，绿色材料很多的比例。白天和饲料，晚上3-4次喂1-2次，清洁饮水的供应。绿色材料后15天可喂整个晚上补喂麦麸，玉米糠和少量粉精矿。气候温和的地方雏鹅后3-5天孵出可放养在附近的牧场，吃草，降低饲养，并且可以放置在室外小鹅可以得到太阳阳光的沐浴水中超过10分钟，之后任何的自*由水15-20天。天很冷，深供水，污水处理和水不把泥场。 28天前小鹅，谨防雨淋，晚上以防止打堆，并经常变化保持稳定的家窝棚的被褥的干燥和清洁。 60天雏鹅投入为主，一般不再补喂糠，麸皮。如果天热时可用砂吧台垫，以防止过热。如果抱窝鹅育雏，只有约100雏鹅，放34鹅和雄鹅。甘德可以防止敌害。 **不比成鹅，它的抵抗力要弱很多，因此对**的照顾比成鹅需要花费更多的精力，由此是对小鹅**的**也是非常重要的，别看这小小的养鹅，要做好也并不是一件简单的事情。