

# 虾蟹养殖中用来杀死杂鱼螺蛳的清塘消毒药物茶粕粉

产品名称	虾蟹养殖中用来杀死杂鱼螺蛳的清塘消毒药物茶粕粉
公司名称	金华市金山油脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要成分:茶皂素 提取来源:油茶籽 外观:颗粒
公司地址	金华市金东区多湖街道金源街388号
联系电话	0579-82160586 13605891303

## 产品详情

主要成分	茶皂素	提取来源	油茶籽
外观	颗粒	检测方法	GB11765-2003
含量	17.3 (%)	应用剂型	粉状颗粒
临床应用	清塘药物	规格	40KG
包装	散装	保存期	18 (月)
新奇创意项目	报名		

温馨提醒：所有商品价格以我司即时报价为准，期望广大客户来电来函咨询。

茶粕，别名茶麸、茶枯，茶籽饼。呈紫褐色颗粒，是金华市金山油脂公司生产野生山茶油的榨油后剩下的果渣。茶粕中含有12-17%的茶皂素，而茶皂素是一种溶血性毒素，能使鱼的红细胞溶化，故能杀死野杂鱼类、泥鳅、c蛳、河蚌、蛙卵、蝌蚪和一部分水生昆虫。茶皂素易溶于碱性水中，使用时加入少量石灰水，药效更佳。由于茶粕的蛋白质含量较高，因此它还是一种高效有机肥，对淤泥少、底质贫瘠的池塘可起到增肥作用。我司生产的茶粕广泛应用于鱼塘清塘、高档草坪杀虫等。同时它还是一种很好的有机肥料。使用茶粕作为清塘药物，比其它药物具有更独特的功效。

- 1、茶粕作为一种绿色药物，它能自行分解，无毒性残存，对人体无影响，使用安全。
- 2、它不杀死水草，对水草还有促长效果。
- 3、对虾、蟹幼体无副作用，并可促进虾、蟹脱壳，从而促进虾，蟹的生长。
- 4、具有增加肥效的作用，在繁育虾苗和培育幼蟹的池塘中使用，可明显提高虾苗和幼蟹的出塘率。

### 茶粕的用途

1、清塘消毒。将茶粕与生石灰或将茶粕与漂白粉混合使用，也有单独用茶粕清塘消毒的。茶粕在清塘消毒中具有药物成本低、就地取材易、去毒快、无残留药害、周转率高等优点，不但可以杀死埋藏在淤泥中的各种低质野杂鱼类，而且还可以杀死各种蛙卵、蝌蚪、蚂蟥以及螺、蚌、蚬等，又对水生植物具有保护作用。

茶粕清塘一般带水清塘消毒。每立方水体用茶粕15 - 20克，先用水浸泡1—2小时，将水和渣一同泼入水中，再加上每立方水体50克生石灰化水溶化混合泼洒全塘。茶粕在光照、水温、盐度、pH值及细菌分解作用下，可培养丰富的浮游生物为鱼种或成鱼落塘提供大量饵料，7天~10天后便可以养鱼。如果不与生石灰混合消毒，则可以与漂白粉混合消毒。方法是每亩水面先用2.5公斤~3公斤漂白粉化水全塘泼洒4小时~5小时后，接着全塘泼洒预先浸烂的茶粕水，漂白粉毒性消失快，5天~7天后可养鱼。如果单独用茶粕清塘，则7天~8天毒性消失后可放种养鱼。

2、可作饲料。茶粕经发酵后可作饲料。根据鱼塘面积和鱼类食性计算，约每亩鱼塘单纯投喂茶粕15公斤~20公斤。先把计算好用量的茶粕放入塘头水泥池发酵，加1/3的水浸泡，然后盖上尼龙薄膜或编织布片，用砖头或石块压着池边四周，严防雨水冲刷，隔4天~5天后再加1/5的水，并翻动一次。池内发酵温度达到30℃以上只需要15天时间，而气温低时则发酵时间相对长些。当看到池面有大小气泡，闻到酒香味或酸味时，则证明其发酵腐熟可作喂鱼饲料。为安全起见，在投喂前应先用100克茶粕溶于10公斤水中，放上几尾小鱼，12小时后小鱼仍活动自如，说明茶粕毒性消失，可以使用。有的养鱼户在50公斤混合饲料中加上5公斤~10公斤经发酵后茶粕，搅拌均匀，可投喂1000公斤~1250公斤重的鱼群。

3、防治鱼病。茶粕还是防治鱼类出血病以及细菌性烂鳃、赤皮、肠炎病的好药物。在鱼种入塘后一个月内或在夏秋季高温鱼病暴发季节(4月~10月)，每立方水体用茶粕5克，将茶粕散洒全池，不但可以杀死鱼体表和鱼鳃的病原体，还可以杀死寄生虫(卵)。最好每个月坚持使用2次~3次，对未发病的鱼类有预防效果和控制作用，对已发病鱼类的治疗效果也很显著。配合生石灰(每亩用20公斤化水泼洒)或漂白粉(每亩用1公斤化水泼洒)，使用效果更佳。

4、福寿螺的克星。近些年夏末初秋，福寿螺在南方已成公认害虫之一。福寿螺依靠自身极强的繁殖力与生命力，迅速蔓延并泛滥成灾，成了农民生产和生活中头痛的东西。散在田里的福寿螺，见青就吃，把许多刚插下的禾苗啃光；生长在鱼塘里，和鲤鱼、鲫鱼抢饵料，与残存的水中生物争夺养分。老死以后，硬壳留在田里、河滩、沟渠，且极易破碎成尖利的刺状物，人脚踩中，疼痛难忍。福寿螺耐受农药，用剧毒农药喷杀“铺”在田里的福寿螺也无济于事。金华市金山油脂有限公司生产山茶油的副产品茶粕是福寿螺的克星，用茶粕清理田里害虫的稻田里的同时，福寿螺将被灭杀。

茶粕的储藏保管方法茶粕怕潮湿发霉，一旦变质，即失去饲料和药物功能作用。茶粕可用编织薄膜袋封闭包装。茶粕要堆放在干燥通风、排水畅通的仓库里，堆积不要太高太厚，要有利于室内空气流通，降温散热，茶粕一般一年不会变质。

### 茶粕的用法用量

1、清塘杀野杂鱼：如每亩水面平均水深0.15米，淡水中用本品2公斤、海水中用1.5公斤以上，加20倍海水或2.5%浓度的食盐水（即40公斤淡水，1公斤食盐）浸泡2小时搅拌，全池均匀泼洒。药效7天。药效消失后才可放苗。如池中泥鳅、黄鳝较多时，用药量加倍。并早一天将全池注水0.15米浸泡，待泥鳅、黄鳝钻出后施用本品，杀灭效果较彻底。2、养殖期杀野杂鱼：在晴天池水溶氧充足时，根据池水深度，按上述比例及方法使用。3、治疗：全池泼洒本品7-10ppm（7-10克/吨）可治疗虾蟹的固着类纤毛虫病，丝状细菌病，丝状藻类附着病，壳吸管虫病、聚缩虫病、蓬蓬虫病等

茶粕使用时间以上午8时~9时为好。鱼、虾混养池不宜使用，因为鱼、虾对茶粕的忍受性差别很大。因此可用茶粕来杀死池中杂鱼；可用茶粕来促进对虾脱壳、调节水色。放养后用茶粕5ppm来杀死水中罗非鱼。对虾脱壳时可用3ppm~6ppm刺激其脱壳，若要定期使用可15天~30天使用一次。池水中pH在9.0以上时，酌量使用可降低pH值。若被钟形虫寄生时，可用茶粕10ppm~15ppm药浴2天再换水。正常对虾脱壳会受月亮盈亏影响，因此在农历初一及十五对虾大量脱壳前后不要使用。水质偏酸须以熟石灰来调整的地区，也不宜使用茶粕。

温馨提醒：因本品对脱壳软虾蟹有刺激，脱壳期慎用！（在脱壳高峰期误用，应立即大量换水）。本品的药效与盐度、温度成正比，盐度、温度越高，晴天中午温度较高时施用，药效较好。

贮存：本品必须在干燥、密闭、阴凉的环境中保存