

批发 优质鲜活毛蚶 毛蚶

产品名称	批发 优质鲜活毛蚶 毛蚶
公司名称	乳山市宏伟水产育苗养殖场
价格	.00/个
规格参数	品种:毛蚶 原产地:山东 规格:30 (粒/kg)
公司地址	山东省威海市乳山市乳山口寨前村南
联系电话	0631-6688900 13806310155

产品详情

品种	毛蚶	原产地	山东
规格	30 (粒/kg)	成活率	90 (%)
杂质	5 (%)		

毛蚶

百科名片

中文名称：	毛蚶	目：	蚶目
外文名称：	scapharca subcrenata	科：	蚶科
别称：	毛蛤、麻蛤	属：	毛蚶属
界：	动物界	分布区域：	中国 、 朝鲜 和 日本
门：	软体动物门		沿海。以
纲：	瓣鳃纲	经济意义：	维生素b12 含量较高的 食用贝类 。

编辑本段生活环境

生活在内湾浅海低潮线下至水深

十多米的泥砂底中，尤喜于淡水流出的[河口](#)附近，以4-8米居多。编辑本段形态特征 成体壳长4-5厘米，壳面膨胀呈卵圆形，两壳不等，壳顶突出而内卷且偏于前方；壳面放射肋30-44条，肋上显出方形小结节；铰合部平直，有齿约50枚；壳面白色，被有褐色绒毛状表皮。

毛蚶

生物学特性：

消化器官由口、食道、胃、肠、肛门、所组成。主要食物为**硅藻**和有机碎屑。生殖腺包在消化腺（内脏团）的周围，性成熟时雌体**性腺**

村（紫）红色，雄体黄白色，生殖孔开口在后**闭壳肌**

的腹面，左右各1个。卵（卵径50-

60微米）在海水中受精孵化。生活在**渤海**

辽东湾的毛蚶多在7月上旬至8月上旬产卵；繁殖期间有2-3次精卵排放高峰，每次间隔约半个月。壳长4厘米左右手个体一次排卵量可

达200万-300万粒。产卵水温多在25-27 间。**幼虫**

在海水中浮游，以担轮幼虫期进入d形幼虫，在150微米时壳顶开始明显大于壳高，近长卵形；壳长达220微米以后出现“眼点”，即将进入附着变态生活。整个浮游期约需16-17天。幼虫结束浮游生活后，以足丝附着在砂粒、贝壳、**海藻**

等固体物上。足丝呈带状，终生存在；脱落后有再生附着的能力。壳长达1.2-1.5厘米时，落入海底进入浅埋生活，约经2-2.5年长成成贝。常见的壳高3厘米，壳长4厘米，宽3厘米。壳质坚厚，长卵圆形，通常两壳大小不等，右壳稍小。背侧两端略显棱角，腹缘前端圆，后端稍延长。壳顶突出，向内卷曲，位置偏向前方，两壳顶距离不很远。壳面有放射肋35条左右，肋上有方形小节结，状似瓦垄。生长纹在腹侧极明显。壳面白色，被有褐色绒毛状壳皮。壳内白色，壳缘具齿。铰合处很窄，呈直线形，齿细密。

编辑本段分布和产季

我国近海海域均有分布，**小满**

后毛蚶产卵停止、个体肥满时即可收获。以**辽宁**、山东和**河北**

省沿海产量最多，产期多在7~9月份。**北部湾**也有一定数量 国内分布：辽宁(大东沟,**庄河**,石城岛,

大连,**金州**,长兴岛,**营口**,盖平,**葫芦岛**),河北(**北戴河**,洋河田,涧河,**塘沽**),山东(羊角沟,**烟台**,

荣城,石岛**海阳**所,五垒岛,麻姑岛,青岛),**江苏**(连云港,**太丰**,如东),**浙江**(定海,**嵊泗**,顺母涂,**乐清**蒲岐),

福建(**平潭**),广东(潮阳编辑本段免疫学影响

甲肝流行是由于人

吃了不洁的毛蚶引发的，这个例子中毛蚶属于传播途径。编辑本段食用方法毛蛤拌菠菜

口味：味道鲜美，清爽可口 主要材料：毛蛤250克、菠菜250克、生姜1小块、大蒜4瓣

调味料:香油2小匙、香醋1小匙、精盐1小匙、**味精**1/2小匙 1、将毛蛤煮熟取肉，姜、蒜洗净后切末；

2、菠菜挑洗干净，焯水过凉，沥干水后切成段；

3、将毛蛤、菠菜、盐、醋、味精、香油、姜末、蒜末拌匀，装盘即可。酱爆毛蚶

1、买回来的毛蚶入到盐水中泡两个小时，吐净泥沙，冲洗干净后捞出备用；

2、豆豉酱加适量清水调匀，姜切片、青红椒切片备用；

3

、

锅中

油七成熟

时，放入姜片炒香

，再放入稀释好的豆豉酱稍炒，放入

青红椒片和毛蚶，再倒入少许**料酒**，炒至完全开口即可。一定要熟。编辑本段其他方面

有时人们也会戏称体毛较多的人为毛蚶，比如赵子博。

陈珺彘被称为毛蚶，是因为他原先被称为冒王（冒尖王），由此产生的音变。