

新津区怎么饲养皖西杂交白鹅

产品名称	新津区怎么饲养皖西杂交白鹅
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

育雏要从1日龄开水和开料做起。雏鹅出壳后16—18小时就表现张嘴伸颈，啄食垫草或互相啄咬，此时要给予温水补水，而后便可开食。***周，每次饲喂时要少给勤添，一般白天喂6—8次，夜间加喂2—3次，配合精料每天每只20—40克，青料喂量为5克。**周喂全价料每天每只50—70克，青料50克。第三周，喂全价料每天每只80—100克，青料的100克。第四周，喂全价料每天每只100—130克，青料150克。第五周开始控料至第七周中间每天每只喂全价料125克，青料200克。第八周开始喂料增加每天每只150克饲料。第九周放开食量尽管吃。70天便可出栏。

2.**用药和药苗鹅出壳后24小时内**注射小鹅血清抗体，每只注射1毫升。***次喂水应加开口药在水里。雏鹅7日龄—9日龄注射禽流感药苗，每只注射0.6—0.8毫升，* *0日喂一次抗病毒的**药。 **2日第2次注射小鹅血清抗体每只注射1.5—2毫升。第20日喂1次浆膜炎和大肠杆菌**药，连喂3天。第30天喂一次打虫药，37天在为喂一次。鹅在33天的时候把上嘴壳剪去一粒米长。

3.小鹅喂养注意事项一般雏鹅正常饲养密度每平方米***周为25只，**周为20只，在正常饲养密度情况下由于温度过低，湿度过大，易造成雏鹅打堆，也会出现啄毛。正常温度和相对湿度：1日龄—3日龄分别为30 ° C—32 ° C和60—70%，注：温差在3度以内。3日龄—7日龄分别为28 ° C—30 ° C和65%—70%。* *周分别为25 ° C—28 ° C和65%。第三周分别为20 ° C—22 ° C和60%。第四周后是15 ° C—20 ° C之间。雏鹅2周内尽量不要让它下地，2周后天气良好的情况下可以慢慢让雏鹅下地玩耍和饮食饮水，但每天早上10点以后才可下地，下午5点以前把雏鹅赶回网上。赶回后要注意网上每格雏鹅数量的均匀度，至到30日后可把小鹅放入大棚里饲养，放入大棚后饲养员**注意密度和温度既可。