

春诚月季基地供应 5公分独杆月季树种植 5公分独杆月季树

产品名称	春诚月季基地供应 5公分独杆月季树种植 5公分独杆月季树
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方城县春诚月季种植基地

月季根癌病菌可在病瘤内或土壤中的植株残体中存活一年以上，5公分独杆月季树，也可在土壤中存活一年之久，主要存活于的表层和土壤中。病菌若二年内得不到侵染机会，即失去致病力和生活力。病菌可由灌溉水、雨水、采条嫁接、耕作农具以及地下害虫等传播，远距离传病多由带病苗木及种条的运输所造成。病菌必须通过伤口才能侵入，如机械伤、虫伤、嫁接伤口等。土壤接触处易遭侵害。从细菌植株到出现症状，一般需要数十天甚至一年以上。偏碱性、湿度大的沙壤土发病较重。

月季花的主要病害有病、黑斑病等;虫害主要有蚜虫、介壳虫、红蜘蛛、卷叶虫、天牛、叶蜂、锯蜂等。

1)病的防治方法

(1)加强栽培管理经常检查，发现病枝叶立即剪除烧毁。控制浇水，少施氮肥，细致修剪，5公分独杆月季树批发，使树冠内膛通风透光良好。

(2)药剂防治在发病期喷1 000 ~2 000倍粉锈宁液或70%的托布津1 000?1 500倍液。早春萌芽前喷3 °?4 °石硫合剂，还可用0.1%~0.2%可湿性悬浮液防治。平常5~7天喷1次，5公分独杆月季树基地，病重时2?3天喷1次。自制悬浮液的方法是：将包在粗布里，放在清水中揉搓即成悬浮液。

夏插：主要是遮阴和保持床土或盆土湿润，保持95%的空气相对湿度，但插床水分不能过多。每天上午9?10时、下午3?4时对插条喷雾，特别是名贵品种要上玻璃罩。或用电子液全光照间歇性喷雾扦插。

冬插：一般是在温室或塑料大棚或小拱棚加盖地膜扦插。管理的首要任务是保温保湿。为了促进扦插生根，可用500 x 10-6?1 000 x 1(T6的丁酸或500 x106的处理插条10?30秒，或对插条进行环剥处理或电诱导扦插。

嫁接月季嫁接所用的砧木有白玉棠、粉团蔷薇和野蔷薇、七姊妹等。嫁接方法可用“T”形芽接、单芽切接、切腹接、劈接、靠接、合接、大芽片接、套芽接、嵌芽接、方块芽接等。

春诚月季基地供应-5公分独杆月季树种植-5公分独杆月季树由方城县春诚月季种植基地提供。行路致远，砥砺前行。方城县春诚月季种植基地致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。