

## 绿化高杆月季树 绿化高杆月季树供应 春诚月季

产品名称	绿化高杆月季树 绿化高杆月季树供应 春诚月季
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方城县春诚月季种植基地

继续花期，日常管理同上月。花后将花枝上有5枚小叶的上部剪除，有望元旦后继续开花。继续扦插和芽接繁殖。采收成熟种子，湿沙贮藏。花谢后换盆，方法同2月。地栽月季，留3个健壮分枝，离地留15cm处重剪。地栽月季，在植株周围开沟施重肥。盆栽月季放室内养护，室内保持5 ~ 2 ，每周浇水1次，每2周施薄肥1次。可望元旦至春节开花。

月季病菌侵害叶片、叶柄、嫩梢及花蕾。感病叶片初期出现褪绿黄斑，逐渐扩大后在两面产生一层白色粉状物，叶片失绿变黄。嫩叶染病后皱缩、反卷、畸形、变厚，有时为紫红色。嫩梢、叶柄染病时，病部稍膨大，节间缩短，反向弯曲。花蕾受害披满，萎缩干枯，花姿畸形。病株反复侵染后，绿化高杆月季树供应，长势衰弱，开花不正常或不能开花。

月季病是由半知菌亚门白尘粉孢菌侵染引起的。病菌的分生孢子串生于分生孢子梗上，分生孢子呈椭圆形，以此侵染传播危害。

有些初学养花者，未能掌握月季的施肥技术，施肥后引起了月季的新梢和嫩叶卷曲，甚至枯萎，以致不能长出花枝，绿化高杆月季树基地，严重时还导致了植株。这是由于施肥的时间和施出量的不恰当而引起的。因为月季刚生出的嫩根受到浓肥刺激时，会引起萎缩，从而导致新梢嫩叶卷曲枯萎。只要不在月季旺发新根期间施用浓肥，就可以避免这种现象发生。

月季是先根后叶，月季在早春和每次花后，地下部分都要旺发新根，地上部分也要萌芽长枝，而且是根先于芽生长。只要看到新芽萌动发梢时，即是地下旺发新根期，就不应施肥，更忌施用浓肥，必须等到新梢上的叶片放平、泛绿后，才能施用较稀薄的液肥。随着新梢、新根不断生长健壮，耐肥力也相应增强，施肥的浓度才能相应增加。在新梢停止生长到下次新芽萌动之前的一段时间，绿化高杆月季树种植基地，月季的耐肥力较强，是施肥的时期。此时可充分施用一些浓度较高的肥料，以满足其生长、开花及下次萌芽、长枝所需养分，且能防止长势，并开出丰满的花朵。

绿化高杆月季树-绿化高杆月季树供应-春诚月季(推荐商家)由方城县春诚月季种植基地提供。方城县春诚月季种植基地是一家从事“月季苗,月季批发,月季树,大花月季,月季”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南阳春诚月季”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使春诚月季在花木中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。