

兴优包 皮术后护理液体敷料创面伤口护理液体喷剂40g促进伤口愈合

产品名称	兴优包 皮术后护理液体敷料创面伤口护理液体喷剂40g促进伤口愈合
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	兴优:兴优 HL型:40g 河南:开封
公司地址	尉氏县新尉工业园区优德大道1号
联系电话	18039570161 18039570161

产品详情

兴优公司生产的包 皮术后护理液体敷料技术要求：

【产品描述】液体敷料由高分子材料（羧甲基纤维素钠）、聚乙烯醇、纯净水组成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。

【预期用途】通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。

产品特点：1、提供湿性、微酸的愈合环境。2、保护创面，减轻伤口疼痛和水肿。

3、控制创面组织液渗出，促进肉芽组织生长。4、溶解黑痂及坏死组织。

5、填充窦道及腔隙类伤口。6、保护外露骨膜、肌腱等，防止创面感染。

【创面急性期】

在受伤早期，由于皮肤浅层的缺损，创面形成，需及时请医生予以伤口清创处理，去除伤口内可能残留的异物，消毒包扎。对于颜面部表浅创面，也可以消毒后暴露处理。伤口保持清洁干燥，防止伤口感染。

【创面结痂期】

创面形成后，组织液外渗，通常2-3天后会在伤口表面形成痂皮。痂皮形成后，会在伤口表面形成一个“壳”状保护层，其下方皮肤的自身修复开始启动，根据伤口面积及深度，通常7-14天左右可以完成再表

皮化。

临床上，在结痂期，患者通常会感觉伤口有痒感，可能会不自主的搔抓痂皮；这种动作须摒弃，因为搔抓痂皮有可能造成痂皮在表皮化未完成时脱落，伤口须再此结痂。反复的伤口刺激可能诱发疤痕增生。

伤口表皮化完成后，痂皮通常会自行缓慢脱落。为了帮助痂皮完成脱落，可以使用兴优液体敷料涂抹于痂皮表面，这样可以加快痂皮脱落的速度。

【创面恢复期】

伤口愈合后，疤痕干预及创面色素沉着处理措施需及时跟进。

黄色人种的创面愈合后多数会合并色素沉着，这会严重影响患者的外貌。伤口愈合后早期阶段，患者须采取防晒措施减少紫外线照射诱发色沉的几率。此外，适当服用些维生素C、维生素E等也有助于减少色沉。