

商丘树状月季基地 景观道树状月季基地 吉华月季

产品名称	商丘树状月季基地 景观道树状月季基地 吉华月季
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

大花月季喜肥，需多次施肥，施肥分为基肥和追肥。基肥多施有机肥，如饼肥、腐熟的鸡粪等，在冬季修剪后至萌芽前进行，施足基肥，翌春1次开花才会花大色艳，开花整齐。大花月季生长季节花大花多且多次开花，需肥量大，所以要经常追肥。追肥可施复合肥，或者将复合肥和尿素按1：1的比例混合均匀后追施。春季1次开花前可追肥1次，庭院树状月季基地，5月1月季花盛开后要及时追肥1次，以促使第2次开花，进入夏季高温季节尽量少施肥或不施肥，秋季天气转凉时可施肥1次，秋季末应控制施肥量，以防止秋末冬初生长过旺导致养分流失。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，商丘树状月季基地，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

1、花盆的大小

花盆不要小于20公分，盆底的眼不能太小，那样渗水不好，五毛钱那么大就行。我们园的盆都是3个眼，塑料盆或瓦盆也可以，瓷盆醉好不要使透气不好。

2、浇水。

干浇湿排，浇就浇透。地栽的把皮管往池里一扔，棒棒糖树状月季基地，放20分钟水，这是指夏季气温较高时。盆栽的浇了水后能很快渗下去就算合适，拿根筷子插一下土，底部干湿就能知道了。

3、打药的问题。

药应每半个月打一次.天气热时10天左右打一次.杀菌消毒:、百菌清、托布津.托菌灵换着打.气温越高间隔时间越短.杀虫:。

4、土壤比例

新邮购的月季请使用园土或沙土。先不要加任何肥料，等以后换土时可按30%泥炭土，5%鸡粪肥(加太多了会烧死)，剩下的就是自己家的园土.一定要搅拌均匀.另外可按30%草炭.5%-10%鸡粪百分之五蛭石.百分之五珍珠岩.其它加园土.新手注意。如果你控制不好鸡粪加入的量，可不使用鸡粪。以后在慢慢追肥。不好找土的花友。可使用营养土加入30%的沙土。栽种时先把盆里垫20公分土，把月季对直立在中间，然后填土，按按实，土要埋深些，离盆顶部2厘米。

5、月季刚出芽时不能上肥，展叶时上尿素或复合肥，现蕾时磷酸二氢钾，每次上肥间隔10-15天视气温而定.气温越高间隔时间越短.如此循环。下雨前施肥醉佳。

6、盆栽月季开春时应换土一次，注意防风.气温高时水要浇足浇透。

7、由于月季在移栽过程中动了根.月季叶子发黄属正常现象.可把黄叶掐掉.叶子掉光了也没事.大胆的掐.移栽后.水先少浇.见干了在浇.过段时间月季就会长新根和新叶出来，勿急。

南阳吉华月季基地，景观道树状月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

月季黑斑病应该如何防治？

防治方法：

发现脱落在盆内的病叶以及植株上染病的叶子应及时清除烧毁，防止蔓延。

发病季节盆土保持偏干。下雨时搬到避雨的地方。

早春发芽前喷施渡美34度石灰硫磺合剂，杀I死越冬病菌。在4-7月间，每10-15天喷洒一次波尔多液。波尔多液可以自制。配制方法是：取一只500克装的空瓶装满水，再投放未经化开的生石灰50克，待生石灰化开后，摇动瓶子使水浑浊，然后沉淀一个晚上。使同时倒出上层清石灰水，在清石灰水里加淡蓝色晶体状硫酸铜(如果分为10次使用，每次加5克硫酸铜)，捣碎化开成淡蓝色混合液，再加入20倍自来水混合即成。如果没有硫酸铜，以10倍自来水稀释上层清石灰水效果也很好。以上配制液不但要可以防治黑斑病，还可防治白I粉病、锈病。

商丘树状月季基地-景观道树状月季基地-吉华月季(推荐商家)由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园实力不俗，信誉可靠，在河南 南阳 的苹果等行业积累了大批忠诚的客户。吉华月季带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！