「杭州白蚁防治公司」散白蚁和家白蚁的区别？

产品名称	「杭州白蚁防治公司」散白蚁和家白蚁的区别？
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

产品详情

先来分析散白蚁和家白蚁头部有何区别？

散白蚁：头呈长方形，淡黄色

散白蚁

乳白蚁：头呈卵圆形，体色近似黄色

乳白蚁

长翅繁殖蚁形态

散白蚁：身体颜色近似灰色，翅膀呈浅灰色，整个身长约9.2-10mm。

乳白蚁：身体颜色呈黄褐色，翅膀呈淡黄色，整个身长约13.5-15mm。

巢穴区别

散白蚁的巢穴比较小，而且很分散；相反乳白蚁的巢穴很大，比较集中，并设有主巢和副巢。如果能发现白蚁巢穴，就能分清是哪种白蚁的巢穴。

当一个巢穴内出现有翅白蚁，足以说明这个巢穴已经非常成熟了，美国亨利、贝斯HenryBess（1970年）报道：

白蚁室内外培养的数量发展是这样的

年：40

第二年：250

第三年：1250

第四年：5000

第五年：均无有翅成虫

数量每年都在成倍增加，一直到第五年都没有出现有翅成虫，也就是说如果一个巢穴中出现了有翅成虫，那么这个巢穴的年龄肯定超过5年。

白蚁建巢初期速度是很缓慢，但后期速度会越来越快，如果任由其发展，白蚁数量不断增加势必白蚁巢穴要扩大；而到了每年的白蚁分飞期，那些长翅膀的白蚁都会跑出来婚飞，建立新巢来扩大自己的巢穴.....

冬季11月份家里会不会出现分飞的白蚁？

正常情况下不会，家白蚁长翅繁殖蚁分飞的高峰期是每年4-6月，而散白蚁的分飞高峰期是每年2-4月份。其它月份分飞也都是有可能性的，

主要跟室外天气有关，只要室外温度跟室内温度相似时，巢穴内长翅白蚁便会从巢穴内飞出去婚飞。

当家里发现长翅膀的白蚁应该怎么办？

先判断这些长翅膀的白蚁是从室外趋光飞入室内，还是从室内某个分飞孔飞出？

如果是室外，只需做好防护措施，然后把从室外飞进来的少量分飞蚁用杀虫剂灭了。

相反确定分飞白蚁不是从室外飞进来的，那就要找下室内有没有一些小的缝隙洞口，那可能就是长翅白蚁的分飞孔，找到后切记洞口不能对着喷杀虫剂，千万不能惊动巢穴内部白蚁，否则会引发巢穴里面的白蚁到处乱窜逃跑。

如何处理白蚁问题？

1、先看家里白蚁情况，如果能看到大量工蚁在爬来爬去，首先考虑白蚁粉剂，让白蚁身上带毒，再通过白蚁同伴间的互相剐蹭和喂食，将毒粉传播在每个白蚁身上，让巢穴内不出窝的白蚁都能中毒身亡。

注：粉剂只有在发现白蚁时才能使用，轻轻且均匀的撒在白蚁身上即可！

2、用粉剂处理白蚁后，过几天等白蚁全部灭亡后，再使用联苯菊酯水乳剂来一次全面预防，联苯菊酯降解慢、不挥发、持效期长、有趋避性，被处理过的区域能形成一个保护圈，在接下来的5-10年都能有效趋避白蚁。

3、当你发现白蚁时，完全不懂如何处理，那么也可以请当地虫害防治师来给您处理，全面勘察后制定方案处理，并提供一定时间内的质保。