

术尔泰羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液

产品名称	术尔泰羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	尉氏县新尉工业园区优德大道1号
联系电话	156**** 156****

产品详情

使用方法

体表及面部直接喷涂湿敷，能使其皮肤柔滑健康。妆前妆后皮肤不适、局部痛痒可用其涂搽、湿敷局部，湿敷时每次10-20分钟。外阴阴道深部清洗保护时，用带有长柄的喷雾器深入，按压喷嘴活塞喷入使其湿润。也可用于老年性阴道黏膜保护，必要时使用1次。眼部灌入洗眼壶，滴或冲洗之用。一般用于冲洗异物。结膜、角膜的异物除去后使用可保护结膜、角膜缓解刺激。对疲劳引起的眼干涩有缓解作用。烧伤、烫伤、冻伤如有大量分泌物时应先清创，然后用3层无菌棉纱浸润本品覆盖创面后包扎，1-3日更换一次敷料。也可以用单层浸湿的棉纱覆盖局部（半暴露），用注射器或喷雾器润湿局部，1-3次/日，必要时多次。不健康的肉芽创面灰暗、萎缩、分泌物多的不健康肉芽创面，用本品浸润无菌棉纱湿敷，1-3日更换一次敷料。待肉芽颗粒红嫩饱满，触之出血时即可植皮。植皮、供皮区补皮或取皮后，用本品浸湿4-6层无菌纱布覆盖植皮、供皮部位，再用无菌纱垫加压包扎。用术尔泰对术野创面及切口湿润与保护，冲洗局部后应吸出残液，一般冲洗用量50-250ml。大型皮瓣移植受皮区在移植前至少在1-3日内用本品浸润无菌纱布4-6层湿敷，每日更换一次。移植后用本品浸湿无菌棉纱4-6层覆盖，加棉垫包扎。间皮、浆膜用本品浸润棉纱湿敷、保护间皮组织浆膜、关节面、肌腱、鞘膜。冲洗润湿表面，可使间皮组织的润滑性大为提高，保护其t-PA活性，阻止病理性机化，促进间皮组织完全性修复。术野用无菌脱脂棉纱浸润术尔泰对术野创面及切口湿润与保护、冲洗局部后吸出残液。一般冲洗用量为50-250ml