

绍兴家庭灭蟑螂用什么蟑螂药有效？

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 绍兴家庭灭蟑螂用什么蟑螂药有效？ |
| 公司名称 | 杭州蚂零鼠环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室 |
| 联系电话 | 18867540091 13605817015 |

产品详情

1.澳洲大蠊

澳洲大蠊成虫体长30毫米，跟美洲大蠊的大小是差不多的，体色呈红棕色。前胸背板两个黑色圆形大斑明显分开，龄若虫深褐色，中胸及第2腹节有白横带，前胸背板有大黑斑，似成虫，这可与美洲大蠊若虫区别。澳洲大蠊的生活习性是和美洲大蠊类似的，唯卵鞘稍大，约1毫米，每1卵鞘有卵约24个，卵期约40天化为若虫；每雌虫产卵鞘20~30个；成虫寿命约4~6个月，完成1代生活史约9个月。北方此虫极少见，而它的危害性主要是在家庭住宅、轮船、列车、浴室、餐厅酒店、图书馆、医院等，污染食品和杂物。

2.黑胸大蠊

成虫体长23~30毫米，体黑褐色。前胸背板黑色或深赤褐色，并略呈三角形，后缘缓弧形，中部稍隆起。它们喜欢生活在室内阴湿场所栖息，日间隐伏于各种缝隙中，夜出活动，聚集于厨房的食品柜、碗柜、抽屉内及下水道、暖气管附近。食性复杂，尤喜西瓜皮、馒头和糖类食品，其次是饼干、米粉和鱼粉。常于夜晚6时后开始出现，9~11时达高峰，至次晨5时全部隐藏不见。卵鞘黑褐色，长约7毫米，扁平、长方形；卵期约50天。一龄若虫黑色，有2条横白带，以后消失。若虫期长达数月，蜕皮10多次完成1代生活史约需1年多。

在上海等城市，此虫与美洲大蠊和德国小蠊混生，是蜚蠊目中室内三大害虫中占优势的一种。它啃食、污染、为害商店、工厂、旅馆、轮船、火车、医院等厨种食品、半成品、日用品等。经检查，发现此虫对几种重要流行性疾病的病原体如霍乱杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌等起着传播、媒介作用。

3.日本大蠊

成虫雌、雄异型，身体赤褐以至黑褐色，体长20~25毫米。雄体狭长，翅发达；雌体前狭后宽，翅短。雄虫前胸背板较小，略作六角形，前缘平直，后缘前有一对斜沟呈倒八字形下陷；雌虫前胸背板显较雄虫大，半圆形，中部隆起，斜沟不显。日本大蠊多以室内的碗柜、炉灶及厕所，室外房前、屋后的树洞、垃圾堆以及下水道口等处为栖息场所。每年5~10月份夜间10时出来活动、觅食。食性广泛、复杂；尤好淀粉、糖类，并啮食同类尸体。若虫有好水特性，尤以初龄为甚。在沈阳，每年发生1代，以若虫在室内

阴暗隙缝及室外院墙缝中越冬。4月中旬出现成虫，6月达高峰，当年若虫开始活动，8月中、下旬出现第二次虫情高峰。

在旅馆、饭店、食品厂、商店仓库、车站、火车、轮船、居民家室等处，严重食害各种食品、衣物、用具，并传染疾病，从而引起卫生和铁路部门的重视，进行调查和指导防治。

不论家里出现了哪种蟑螂，它们的危害都是非常大的，那家庭灭蟑我们应该采取什么方法？

1、使用蟑螂屋，所谓的蟑螂屋就是一个粘蟑螂的小屋子。设计成屋状形式，点就是防尘；第二点是防止害怕蟑螂的女性朋友，在沾满了蟑螂后，可以直接拎着蟑螂屋上面的小扶手直接扔至垃圾桶；第三点符合蟑螂喜欢钻洞的习性。蟑螂屋是有很多入口的，主要是为了符合蟑螂喜欢钻洞的习性。因此蟑螂屋设计成屋状形式，可以增加捕获蟑螂的几率。使用蟑螂屋可以大大减少室内蟑螂的密度。

2、蟑螂的繁殖速度很快，光靠蟑螂屋是只能减少蟑螂的密度，但想完全消灭蟑螂是不可能的。因为蟑螂窝内的小蟑螂是不出窝的，所以用蟑螂屋是粘不到的。因此也可以用含有吡虫啉成分的蟑螂胶饵来灭，针筒设计，点在蟑螂喜欢隐藏的一些缝隙地方，墙壁裂缝处、厨房碗橱、卫生间有水源的地方，蟑螂吃到诱饵，会出现不舒服的现象，回窝休息，3小时才会达到击倒作用；而在死亡前蟑螂排出的有毒排泄物被窝内的小蟑螂吃掉，就可以让不出窝的小蟑螂全部中毒身亡。而死亡的蟑螂尸体，则会被窝内的大蟑螂吃掉，形成一个相互传染的目的，使蟑螂群体全部灭亡。