

腰围固定支具A胸腰部固定支具A医用腰围矫形器

产品名称	腰围固定支具A胸腰部固定支具A医用腰围矫形器
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:大中小 型号:胸腰椎固定支具 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

臀围作为一种腰部支撑架，关键医疗的作用是制动系统，便是限定椎间盘的弯曲等系列活动；其次缓冲作用，配戴臀围后，降低了腰部活动，从而对椎间盘具有缓冲作用并增强了椎间盘的稳定。选购与制作臀围或腰部矫形器一般要以配戴后是不是舒服、能不能起缓冲作用为基本准则。

病人使用时要注意以下几个方面：1、臀围的尺寸要和自身腰的长短、腿围相一致，其内缘须达肋下缘，外缘至臀裂下列。上端须使腰维持平整，下边需与臀部曲线相一致，而且好期间用钢板支条或弹簧钢板竖直结构加固。臀围配戴后一定要避免椎间盘过多前凸，而臀围太窄有可能会使腰椎前凸扩大。除此之外，为防止配戴时过紧，能选韧性好的弹力腰围。2、臀围配戴的时间也应该根据病况适度把握。在腹部病症偏重时，如配戴无不适觉得，要定期戴用，不必随时随地取出，同时可相互配合牵引带、针灸理疗、保健按摩等医治开展。病况较轻情况下，可以从出行时，特别是必须长时间一个姿态坐的情况下（如搭车出行时）戴着，睡觉或歇息时需消除臀围。腹部病症消失之后，不可再配戴臀围了。3、配戴臀围后仍然需要注意腰部活动。因为臀围制了腹部弯曲等方面主题活动，并没降低作用力，因而，应尽量避免腹部过度主题活动。一般并完成日常生活与工作简单地主题活动为宜。4、使用臀围或腰部矫形器期内，需在医生的指导下开展腰背肌和腹部肌肉的训练，以避免和缓解相关肌肉组织废用性萎缩，融入在没臀围或腰部矫形器维护中的主题活动。5、配戴臀围时长。正常情况下配戴臀围时间按3~6周起宜，长不得超过3个月。而且在睡眠质量、歇息及不疼或轻微疼痛感时，应适当取下臀围一段时间，为未来彻底撤销臀围积极主动发挥特长。