

日本进口间苯二酚住友原装一袋可发

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 日本进口间苯二酚住友原装一袋可发 |
| 公司名称 | 山东金悦源新材料有限公司 |
| 价格 | 39000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:日本住友 含量:99% 规格:25kg/袋 |
| 公司地址 | 北园大街409号 |
| 联系电话 | 15153132028 15153132028 |

产品详情

中文名称:间苯二酚

英文名称:Resorcinol

间苯二酚又名1,3-苯二酚,俗名雷锁辛(resorcinol)。在农药上用于合成杀虫剂蝇毒磷的中间体3-氯-4-甲基香豆素和除草剂乙氧氟草醚,也可用于制造多种染料、特种涂料、医药、感光材料、合成树脂、胶黏剂、化妆品等。

熔点 109-112 °C(lit.) 沸点 281 °C 密度 1.27

蒸气密度3.8 (vs air) 蒸气压1 mm Hg (21.1 °C)

折射率 1.5781 FEMA 3589 | RESORCINOL 闪点 340 °F

CAS号:108-46-3 分子式:C6H6O2

分子量:110.11 EINECS号:203-585-2

用途 用于感光胶片、医药、染料和化纤工业

用途 用作分析试剂

用途 检定和比色测定锌、铅、酒石酸、硝酸盐和亚硝酸盐,比色测定糠醇和糖,检验酮糖、木质素的试剂,重氮化合物盐类试剂,有机合成

合成方法*早的间苯二酚是由天然树脂蒸馏或碱熔制得的,现在大多采用苯磺酸用发烟硫酸磺化生成间苯

二磺酸，再经中和、氢氧化钠碱熔、酸化、萃取及蒸馏得到。此外，间苯二酚的制取方法还有：

1. 间碘苯酚、间羟基苯磺酸与碳酸钾共熔；
2. 亚硝酸与间氨基苯酚作用；
3. 间二硝基苯加氢制得间二苯胺，再与盐酸反应水解；
4. 用苯和丙烯采取过氧化二异丙苯法生产，过程与异丙苯法类似。

注意事项

- 1、可使淡色发染黑，用药后数天内可使皮肤发红和脱屑，需慎用本品。
- 2、皮肤黝黑患者，因可刺激色素生成。
- 3、与肥皂、清洁剂、痤疮制剂、含有酒精制剂或维A酸等共用，可引起皮肤过度刺激或干燥作用。
- 4、有抗甲状腺作用，长期应用(特别应用在溃疡面上)可导致黏液性水肿。
- 5、本品有毒，本品不可全身使用或长期使用，皮肤破损伤口处不宜涂搽，以免吸收中毒。