

石家庄好的荨麻疹治疗医院【普济皮肤科】荨麻疹预防治疗中心

产品名称	石家庄好的荨麻疹治疗医院【普济皮肤科】荨麻疹预防治疗中心
公司名称	石家庄市普济医院皮肤科
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华区汇通路35号
联系电话	0311-80817237 13663216258

产品详情

石家庄最好的荨麻疹治疗医院【普济皮肤科】荨麻疹预防治疗中心 联系电话：谢主任，李教授 13663216258；0311-80817237 医院网址：<http://www.hbpjyy.com>；www.sjzpifuke.com 荨麻疹 荨麻疹（Urticaria）俗称风团、风疹团、风疙瘩、风疹块（与风疹名称相似，但却非同一疾病）。是一种常见的皮肤病。由各种因素致使皮肤粘膜血管发生暂时性炎性充血与大量液体渗出。造成局部水肿性的损害。荨麻疹迅速发生与消退、有剧痒。可有发烧、腹痛、腹泻或其他全身症状。可分为急性荨麻疹、慢性荨麻疹、血管神经性水肿与丘疹状荨麻疹等。得了荨麻疹要及时远离过敏源，并选择专业物进行治疗，如斯汀可林等，以防病情恶化。1.皮疹为风团、潮红斑，大小不等，形状各异。常突然发生，成批出现，数小时后又迅速消退，消退后不留痕迹。但可反复发作；2.自觉瘙痒，可伴有腹痛、恶心、呕吐和胸闷、心悸、呼吸困难，少数有发热、关节肿胀、低血压、休克、喉头水肿窒息症状等；3.病程长短不一，急性荨麻疹病程在1个月以内；超过1个月为慢性；4.皮肤划痕试验部分病例呈阳性反应；5.临床的特殊类型：

(1)蛋白痂荨麻疹是蛋白痂直接通过肠粘膜吸收所致的抗原 - 抗体反应；
(2)寒冷性荨麻疹又可分为家族性寒冷性荨麻疹和获得性寒冷性荨麻疹，是由寒冷所致的物理性荨麻疹；
(3)热性荨麻疹又可分为获得性和遗传性两种，接触热水后在接触部位出现风团；(4)胆碱能性荨麻疹，在热、精神紧张和运动后诱发，多见于躯干和四肢近端，皮疹为1 - 2mm大小的风团，周围有红晕；
(5)日光性荨麻疹，女性发病较多，暴露日光后发病，皮疹局限于暴露部位；(6)压迫性荨麻疹，在较重和较久压迫4 - 6小时后发病，受压部位出现弥漫性、水肿性、疼痛性斑块；
(7)水源性荨麻疹，在接触水和汗水后于毛孔周围引起细小剧痒风团；(8)血清病性荨麻疹，其病因为接触异体血清、疫苗、物等，引起的抗原抗体复合物反应，临床表现为发热、皮疹、关节炎和淋巴结病；
(9)自身免疫性黄体酮性荨麻疹，发生于月经前期和中期，是由黄体酮所致。

1.尽可能去除或避免一切可疑原因；
2.内服抗组胺物，有全身症状者可使用皮质类固醇激素，或对症治疗；
3.对检查变应原试验阳性的变应原进行脱敏治疗；4.有感染者可采用抗菌素治疗；
5.慢性病例可试用封闭疗法、自血疗法、针刺疗法、氧气疗法、组织疗法、排汗祛毒法；慢性荨麻疹可采用中预防:西藏紫草露具有抗自由基，提高免疫功能，促进代谢，调节神经系统和内分泌系统等多种功能，有明显的抗过敏作用一般急性荨麻疹不需作检查；慢性荨麻疹作变态反应原检测荨麻疹病因复杂，致敏源广泛。明确病因是避免复发的关键，对无法避免的致敏源可给予脱敏治疗或预防性服。根据不同的类型选用不同的治疗方案。急性荨麻疹尤其是伴有全身症状者应及时就诊，慢性患者可使用多联疗法

或长期用逐渐减量，尽量使用最小维持量。