

## 张家港白蚁防治所——定点白蚁防治中心电话。

产品名称	张家港白蚁防治所——定点白蚁防治中心电话。
公司名称	永满科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	全国
联系电话	4009603303 4009603303

## 产品详情

白蚁防治\*有效的方法是什么？白蚁是一种\*古老的昆虫之一，在地球上生存已有几亿年的历史了，是破坏性极大的世界性害虫。目前中国大陆已知白蚁有476种。白蚁主要危害房屋建筑、水利、堤坝、地下电缆、农林作物、文物档案等。全世界每年因白蚁防治至少花费220亿美元，其中中国约为3.5亿美元的防治费用。

### 1、白蚁危害的特点

#### 1) 隐蔽性

白蚁生活在地底世界中，筑巢在泥土中、木头里或在高大的土垆内，修筑隧道活动隐蔽，危害不易被人察觉，一经发现后果已经很严重。

#### 2) 广泛性

白蚁危害范围十分广泛，涉及面积十分广阔，如房屋建筑、交通设施、电讯设备、江河堤围、水库土坝、档案图书、纺织品、各种农林植物等。

#### 3) 严重性

危害率高，破坏性大；白蚁造成的损失惊人，据资料统计，在房屋建筑方面，长江流域危害率一般可占房屋总数的40% - 50%；华南地区危害率可上升到60% - 80%，广东可高达90%。据统计，全国23个城市仅房屋白蚁造成的损失，每年约800亿人民币。

#### 4) 易传播和扩散蔓延

白蚁会传播到新的国家或地区，已有记录的种类达40多种，楹白蚁属（*Incisitermes*）传播其他地区或国家的种类已有7种，散白蚁属（*Reticulitermes*）有4种。

### 2、白蚁危害的种类

### 1) 白蚁对房屋建筑的破坏

房屋不论是泥木结构、砖木结构、混凝土结构均可受到白蚁的危害，严重的甚至引起房屋倒塌，人员伤亡。

### 2) 白蚁对交通设施和电讯设备的破坏

白蚁常蛀蚀铁路枕木、车厢、铁路与枕木之间的垫板。据调查，南方约有20% - 25%的车厢受白蚁危害。轮船、轮渡、木驳船和码头等也受白蚁危害；珠江内河船只受白蚁危害率达54.7%。白蚁对埋地通信电缆塑料护套层的蛀蚀占广东省通讯线路总故障率的60% - 80%。此外，白蚁对漆包线、胶皮线、黄蜡布、线槽板和开关板等电力器材也能破坏，严重的可引起短路事故。

### 3) 白蚁对江河堤围和水库土坝的破坏

白蚁能在江河堤围和水库土坝内密集营巢，迅速繁殖，菌圃星罗棋布，蚁道四通八达，有些蚁道甚至穿通堤坝的内外坡。据调查，南方各省15年以上的河堤和水库堤坝90% - 100%有土栖白蚁。据统计，湖北荆州大堤长182.4公里，有白蚁堤段占50.6%；荆州地区有大、中、小型水库732座，约有80%以上水库受白蚁危害。

### 4) 白蚁对农林植物的危害

许多林木、果树和农作物都可遭受白蚁侵袭。据初步调查，白蚁危害各类植物达300多种。轻则影响树木的正常生长，重则造成树木空心、死亡。在我国南方丘陵地区杉木林基地，白蚁危害一般达40% - 60%，以杉木新产区受害更重，严重的植株被害率达100%，1990年杭州受白蚁危害的常见园林树木达130多种，分布于各主要风景点。

## 3、如何防治白蚁

白蚁的危害具有高度的隐蔽性和破坏性，当发现其危害时，往往已经造成不可挽回的损失，因此，白蚁的防治是极为重要的。

首先，要鉴定出白蚁的种类，这对防治极为重要，因为蚁种不同防治方法略有不同，其次，防治方法要正确。即便是专业的白蚁防治公司，也有一部分在白蚁防治上照本宣科，因而收效甚微。这是因为在白蚁防治中实践经验是极其重要的，如：蚁巢、蚁路、蚁线、吸水线的寻找及土白蚁的蚁被、指示植物的寻找，没有三五年经验是很难找到的，而这些对防治又是极为重要的，少了这一环，可以说防治是收不到效果的。白蚁防治方法如下：

消灭乳白蚁\*有效的方法是找到蚁巢并在巢内施药。找不到蚁巢，在危害地点或有外露特征部位施药，则须掌握特定施药技术，在白蚁活动旺盛的季节进行，才能彻底消灭蚁患。找到白蚁巢，应先诱集、后施药，以保证效果。

1、粉剂毒杀法防治白蚁，找到蚁巢后，在巢上打3个品字形的孔，见有兵蚁前来守卫时即喷药。用喷粉器向孔内施药5 - 6次，每次5g左右。施药后用废纸或棉花堵住孔口，然后敲打附近的木板，造成白蚁混乱，增加其与毒粉的接触机会。

2、粉剂毒杀法防治白蚁是目前防治乳白蚁使用\*为广泛的方法。常用的灭蚁粉剂，有以亚砷酸钠为主的砷制剂和六氯环戊二烯系列杀虫剂产品灭蚁灵等两种。

在喷施灭蚁药粉时，要注意：喷药时不要将蚁路挑开过大，喷药后不能立即移动被害物，要将喷药孔用碎纸或碎棉絮轻轻塞住，不让沾药的白蚁爬出，并使白蚁因通风露光停止在该处活动。雨天不宜在室外喷药，如喷药处被雨水淋湿，要重新喷施。

掌握施药季节。每年3 - 10月为乳白蚁活动季节，尤其是每年3-6月长翅繁殖蚁分飞前后季节，白蚁外出活动、取食、修筑蚁路和分飞孔,大量暴露在蚁巢外，抓住此时机施药，可提高毒粉传播效果。掌握施药部位。施药时要朝蚁路、分飞孔、被害物上及蚁巢中施药。

### 3、熏杀法防治白蚁

用磷化铝熏杀大树内的白蚁巢，效果良好。若粮仓发生白蚁危害，可利用仓虫熏蒸兼治白蚁。

### 4、挖巢法防治白蚁

有明显外露迹象，可以判定巢位时，应在距巢外围50 - 100cm左右的地方开挖，不破坏巢体周转的防护层。将防护层外的泥土刨掉后，搬出整个巢体。取出的巢体如不保留时，可将其破碎作鸡、鱼饲料，或淋上煤油烧掉。

没有外露迹象，无法判定巢体位置时，可选择有分飞孔或白蚁危害\*早处的下方，将泥土挑开，找出地下蚁路（乳白蚁地下蚁路有青色或灰色的分泌层），跟踪追挖。

### 5、诱杀法防治白蚁

在蚁情不清楚，一时找不到蚁巢时，可用诱杀法进行灭治。诱杀有食饵诱杀和毒饵诱杀等两种方法，毒饵诱杀是利用对白蚁具有较强引诱作用的食物作为诱饵，加入一定剂量的“灭蚁灵”，配制成毒饵后投放在白蚁活动的地方，任其自行取食，使之中毒、传递，造成全巢死亡。

帮帮拜思特白蚁防治公司，竭诚为您服务，欢迎来电咨询！