

## 杭州白蚁防治站地址电话

产品名称	杭州白蚁防治站地址电话
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

## 产品详情

黑翅土白蚁为等翅目，白蚁科，土白蚁属的一种昆虫。舒城县有分布。

一、形态特征：黑翅土白蚁具有昆虫的基本特征。其体躯分头、胸、腹三部分。头部可以自由转动，生有触角、眼睛等感觉器官，口器为典型的咀嚼式。胸部分前胸、中胸、后胸，分别生一对足；有翅成虫的中、后胸各生一对狭长的形状、大小几乎相等的膜质翅。腹部10节。体色较浅淡，近于乳白色。体长几毫米到十几毫米，有翅成虫的长度约为10-30毫米。多年生蚁后由于生殖腺的发达，腹部极度膨大，个体长可达60-70毫米，有的可超过100毫米。

二、危害特征：黑翅土白蚁是营“社会性、多型态、巢群生活”的害虫，每巢有几十万至几百万头，是一种土栖性害虫。主要以工蚁危害树皮及浅木质层，以及根部。造成被害树干外形成大块蚁路，长势衰退。当侵入木质部后，则树干枯萎，极易造成死亡。采食危害时做泥被和泥线，严重时泥被环绕整个干体周围而形成泥套，特征明显。

三、发生规律：黑翅土白蚁有翅成蚁一般叫做繁殖蚁。每年3月开始出现在巢内，4—6月份在靠近蚁巢地面出现羽化孔，羽化孔突圆锥状，数量很多。在闷热天气或雨前傍晚7时左右，爬出羽化孔穴，群飞天空，停下后即脱翅求偶，成对钻入地下建筑新巢，成为新的蚁王、蚁后繁殖后代。繁殖蚁从幼蚁初具翅芽至羽化共七龄，同一巢内龄期极不整齐。兵蚁专门保卫蚁巢，工蚁担负筑巢、采食和抚育幼蚁等工作。蚁巢位于地下0.3—2.0米之处，新巢仅是一个小腔，3个月后出现菌圃——草蓀菌体组织，状如面包。在新巢的成长过程中，不断发生结构上和位置上的变化，蚁巢腔室由小到大，由少到多，个体数目达200万以上。黑翅土白蚁具有群栖性，无翅蚁有避光性，有翅蚁有趋光性。4—5月和9—10月为采食为害高峰期，进入盛夏后，工蚁一般不进行外出活动。11月底后工蚁停止外出采食，回巢越冬。

## 四、防治措施：

- 1、挖巢灭蚁：沿蚁道顺藤摸瓜，追挖蚁巢。
- 2、熏烟灭蚁：将毒烟送进蚁巢，熏死白蚁。
- 3、施药灭蚁：在白蚁活动频繁区，用灭蚁灵喷白蚁体、使其相互交替毒杀。
- 4、诱杀灭蚁：在白蚁分飞和活动季节，采取灯光诱飞蚁、挖坑诱白蚁等将其引来进行毒杀。
- 5、浇灌灭蚁：在石头较多的山区、以及离巢近、难度又相当大的地方采用菊酯类药液浇灌蚁道、蚁巢灭蚁。
- 6、清洁林地：及时清理林地中枯枝落叶。

黑翅土白蚁成虫头、胸、腹背面黑褐色，腹面棕黄色，前胸背板中央有一淡色十字形纹，纹两侧前方各有一椭圆形淡色点。该虫危害的树种很多，主要有杉木、柚木、栎类、栗类、桉类等70多种。

该白蚁主要危害苗木枝干和根系，往往会造成苗木生长萎缩，甚至枯死。

### 防治方法

- 1、施药预防：苗圃播种前，用50%辛硫磷500倍液撒施圃地，并翻挖入土深20厘米左右。
- 2、毒饵法 用白蚁喜食的如面包屑、麸皮、或碎草等，按照一份药2份白蚁净饵料的比例加少量水搅拌后在白蚁经过的地方进行撒施布点，布点适当多些；
- 3、喷雾 对于树干、墙体或地面上白蚁密度比较大，可直接白蚁净兑水稀释，对着白蚁进行喷雾，稀释倍数为500倍；
- 4、滴灌  
对于发现蚁穴的，可以白蚁净300-500倍液对蚁穴及周围进行滴灌，有条件的可把蚁穴挖开，效果更好。