

杭州市白蚁防治中心-灭白蚁方法

产品名称	杭州市白蚁防治中心-灭白蚁方法
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市下城区岳帅桥10号1幢450室
联系电话	15968874527 13605817015

产品详情

白蚁的危害，主要还是通过其破坏力，为我们的生活环境带来安全隐患，甚至是生命安全，以及造成巨大的经济损失。白蚁喜欢阴暗、温暖、潮湿的环境，在南方地区比较常见，所以在白蚁活跃的地区，必须要时刻警惕白蚁的侵害。

高温灭白蚁

以上三种灭蚁方法可以单独使用，也可以综合使用

由于夏天天气炎热，阳光非常强，此时也是白蚁侵害*严重的时节，若是家里的家具有被白蚁侵害，就可以将家具搬到太阳下暴晒，这样在阳光下，白蚁就会因为高温和缺水而很快死亡。另外，也可以用开水浇灌在家具上，同样可以用高温将白蚁杀死。

喷洒药剂

对于不能移动的木质品，可以在白蚁藏身处，或是经过的地方，喷洒粉剂型的灭白蚁药剂，一旦白蚁接触到粉剂后，就会将其携带到各个地方，由于白蚁会相互清洁，这样就会令更多白蚁都接触，并产生中毒，这样则可以导致整窝的白蚁都被消灭干净。

除了专业性，在白蚁中实践经验是极其重要的，如：蚁巢、蚁路、蚁线、吸水线的寻找及土白蚁的蚁被、指示植物的寻找，没有一定的经验积累是很难找到的，而这些环节对又是极为重要的，少了这一环，难以达到理性的效果当然，我们要保持房间干燥通风，特别是厨房，卫生间

挖掉蚁巢

对于室外的白蚁，的办法是直接将蚁巢挖掉，让整窝白蚁无处遁形。我们可以顺着白蚁的活动轨迹，然后找到白蚁的巢穴，再将其挖掉，这样就能够将它们一锅端。在挖掉蚁巢后，对于蚁穴内的白蚁，也可以利用，或是开水，将其快速灭杀，避免遗漏。

诱饵灭杀

在白蚁出没，或是可能出没的地方，可以放置诱饵盒，通过诱饵，来吸引附近的白蚁，前往到诱饵盒中，而通过诱饵中的，在白蚁进食后，*终将其灭杀。诱饵盒既可以作为白蚁灭杀手段，也可以作为日常的防范手段，需要注意的是，诱饵盒要定期检查和更换。

扬中市白蚁中心，灭白蚁方法。定点白蚁中心，白蚁所电话号码

经记载白蚁分4科44属476种，其中散白蚁属种类*多，超过100种，其次是土白蚁属、大白蚁属和乳白蚁属。

蚁也被称为虫尉，世界上通常被称为大水蚁(通常出现在雨前，所以被命名)等翅膀昆虫的总称约有3000种以上

若以长江为界，其分布状况是越往北种类越少；越往南种类越多。以省份二轮，云南地区种类*多，其次是两广、福建和海南。除新疆、青海、宁夏、内蒙古、黑龙江和吉林外的其他28个省（市）、自治区和特别行政区均有白蚁分布，从辽宁（丹东）、北京分布至约北纬40°，到山西（介休）、陕西（韩城、铜川）、甘肃（文县）、（墨脱、错那），从东到西形成一条抛物线。

散白蚁属分布纬度*北到北纬40°，丹东、北京；土白蚁属到北纬35°，河南（洛阳）；乳白蚁属到江苏（建湖），约北纬33.5°；堆砂白蚁属到四川（江安，北纬28.4°）。筑垅白蚁：土垅大白蚁、云南土白蚁、球白蚁、锯白蚁等主要分布在热带和亚热带地区约北纬22.8°。白蚁分布区约占全国陆地总面积的35%-40%。

白蚁季来临“米虫”*喜欢吃大米、香菇、红枣等食物，因此被称为“仓储害虫”，这些“米虫”及飞蛾本身并不太传染，因此对居民并没有太大危害3-6月是白蚁“蠢蠢欲动”的季节，随着气温不断升高，白蚁活动开始变得频繁。白蚁是营巢穴性、群栖性，多生活形态的有害昆虫，在长期适应环境的过程中，白蚁群体出现了“社会分工”的现象，白蚁家族分为繁殖蚁和不育蚁。整个白蚁家族来看，繁殖蚁只占了极小一部分，有蚁王、蚁后、长翅繁殖蚁、短翅繁殖蚁和无翅繁殖蚁，在白蚁巢穴中有蚁后和蚁王，

主要负责繁衍后代，依赖工蚁喂养和照顾，成熟期蚁后体型巨大，特别是腹部。而不育蚁有兵蚁和工蚁，兵蚁则担负着保卫蚁巢、保卫工蚁活动和长翅繁殖蚁安全分飞的任务。工蚁负责建巢、修路、汲水、采食、搬运蚁卵、喂食及清洁蚁巢。

白蚁的危害具有高度的隐蔽性和破坏性，当发现其危害时，往往已经造成不可挽回的损失，因此，白蚁的是极为重要的白蚁三个要点1如果在4-6月份的大雨前后傍晚发现有飞蚁围绕灯光飞翔,较好关窗,并在灯下放置一盆水,飞蚁会脱翅掉进水中;2如果在阳台墙角或其他地方发现脱翅的繁殖蚁,可沿着墙角喷少量的杀虫水(主要是厨房、洗手间等水源集中的地方);3如果在家中发现有白蚁危害的明显迹象时,切勿惊扰白蚁,否则极易造成白蚁转移,这对灭治白蚁带来更大的难度,建议请白蚁专业机构的技术人员上门治理

认识"分飞"白蚁白蚁季来临，居民家庭室内比较容易见到是"分飞"白蚁，分飞白蚁主要有两种：散白蚁：2-4月闷热中午，活动范围在主巢50米左右；扩散面积可达8000平方米。家白蚁：4-6月闷热傍晚，活动范围在主巢12米左右；扩散面积可达500-600平方米。

繁殖蚁的危害1.对于室外飞入的分飞蚁不于恐慌，数量虽多，但成功繁殖存活的比率很低，不会对造成直接伤害，也不会侵蚀树木、破坏建筑。如果纷飞的白蚁降落到地面后，翅膀脱落，寻找到新的湿润隐蔽地点筑巢，会建立新的蚁群。若发现室内很多掉落的翅膀，就要注意了，分飞蚁已经配对成功，开始脱翅，寻找合适地方筑巢了。2.对于室内飞出的繁殖蚁要引起强烈关注，飞出的白蚁只是"冰山一角"，是整个白蚁群体的一小部分，而隐藏在建筑物内部的白蚁，才是主力军。

白蚁是营群体生活的昆虫，蚁巢在其生活中具有重要的作用，因此白蚁的生态环境可分内环境与巢外环境，它们相互有机地构成了错综复杂的关系。

3.土壤消毒法为了预防白蚁从公开蔓延为害，能够用撒在桉树树基土壤上面停止土壤消毒，普通来说能

够有效预防白蚁20年

白蚁的食物

低等白蚁大多数种类取食以纤维素为主要成分的植物，高等白蚁中有少数种类取食植物，大多数种类取食真菌、土壤、腐殖质、动物的产物、地衣、苔藓、藻类等。

除此之外，白蚁还能同一蚁巢内的白蚁、幼蚁发育中蜕下的旧皮，在外界食物缺乏的情况下也能蚁卵甚至幼蚁，但这些均不是白蚁营养的主要来源。

虽然白蚁食性较杂，但并不是每种植物都取食，在食物极为丰富的情况下仍有一定的选择性，如在数百种植物分布的自然森林群落中，白蚁通常偏爱含糖分、淀粉、带芳香的植物。

当然在食物单一的情况下，白蚁也可取食单一树种，并造成严重危害。因柚木、铁木、苦楝、荔枝、柏木以及它们的木料内含有萜烯醇物质，白蚁一般对这类植物不取食。

不同种类的白蚁喜食植物及取食部位也不同，如象白蚁的许多种类嗜好并巢居壳斗科等杂木内；

乳白蚁和散白蚁特别喜食松木和杉木，但较少蛀食活的松树和杉树。

黄翅大白蚁对樟树、杉树的皮层很嗜好，但对槐树、杨树、桃树则喜食心材。

总之，白蚁种类不同所蛀食的植物种类和取食的部位均有所不同，就是对同种植物的活体和死体不同状态，白蚁也有强烈的选择性，有的喜欢蛀食活体植物，有的则喜食干枯植物。