

洋葱霜霉病防治，黄皮洋葱，地球种子，中日照，进口洋葱

产品名称	洋葱霜霉病防治，黄皮洋葱，地球种子，中日照，进口洋葱
公司名称	石家庄正业蔬菜销售有限公司
价格	180.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华区裕华东路106-1号
联系电话	0311-67667773 13803376310

产品详情

地球—中日照黄皮洋葱种子 中熟品种，株高60厘米左右，叶绿有腊粉，长势旺，抗病能力强，适应在石家庄以南、山东大部、南京以北等地区种植。该品种鳞茎球形，外皮较厚，棕黄色，干物质含量高耐存放，有较高商品性。规格：100g/罐。石家庄正业蔬菜销售有限公司，经营洋葱购销，洋葱种苗购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。电话：18931885036，QQ：1307717739

洋葱霜霉病防治【症状】主要为害叶及花梗，也可侵染洋葱鳞茎。叶片染病，从中下部叶片开始，病部以上渐干枯下垂。花梗染病，初生黄白色或乳黄色较大侵染斑，纺锤形或椭圆形，其上产生白霉，后期变为淡黄色或暗紫色，假茎染病多破裂，弯曲。鳞茎受害，地上部生长不良，叶色淡，无光泽，叶片畸形或扭曲，植株矮缩，表面产生白色霉层，扩大后软化易折断。

【病原】Peronospora schleidenii称葱霜霉菌，属鞭毛菌亚门真菌。孢囊梗单生或丛生，顶端有3~6次二叉状分枝，无色，无隔膜。孢子囊单胞，卵圆形，淡褐色。卵孢子球形，具厚膜，呈黄褐色。

【发生规律】以卵孢子在寄主或种子上或土壤中越冬，翌年条件适宜时萌发，从植株的气孔侵入。借风、雨、昆虫等传播，进行再侵染。成株期至采收期发病最重。浙江及长江中下游地区主要发生在3~5月和9~11月；东北地区4月中旬~5月上旬开始发病。一般连作地块，土质黏重，地势低洼，雨后易积水，种植密度过大，田间通透性差，早春、梅雨季节、秋季雨水较多发病重。

【防治方法】与非百合科蔬菜轮作2~3年以上。选择地势较高，不易积水的地块种植，施足充分腐熟的有机肥，合理密植，适时施肥适时浇水，促进植株健壮生长，小水勤浇，严防大水漫灌，雨后及时排除田间积水；收获后及时清除田间病残体，并集中销毁。